

Ibum Express 400 mg 24 kaps.



Cena: 25,98 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	400 mg
Opakowanie	24 kaps.
Postać	kapsułki miękkie
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Skład:

Substancja czynna w 1 kapsułce: ibuprofen – 400mg. Substancje pomocnicze: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, woda oczyszczona, żółcień chinolinowa E104, błękit patentowy E 131 (barwniki).

Działanie:

Niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) nie tylko łagodzi stany zapalne, ale również działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Ta trójkierunkowość jest wynikiem blokowania enzymu (cyklooksygenazy prostaglandynowej, inaczej COX), który przekształca niektóre substancje obecne w organizmie w prostaglandyny. Duże powinowactwo ibuprofenu do COX sprawia, że Ibum Ekspres zwalcza ból już po kilkunastu minutach. Lek skutecznie łagodzi stany zapalne, przyspieszając ich leczenie. Dodatkowo działanie przeciwgorączkowe pozwala wspomóc objawowe leczenie przeziębienia i grypy.

Zastosowanie:

Ibum Express polecany jako środek przeciwzapalny i przeciwgorączkowy w objawowym leczeniu przeziębienia i grypy oraz jako produkt przeciwbólowy.

Informacje dodatkowe:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Przeciwwskazania:

Nie należy przyjmować w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu; choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy; perforacji i krwawienia, w tym po stosowaniu NLPZ; ciężkiej niewydolności wątroby, nerek lub serca; u osób, u których stwierdzona alergia na kwas acetylosalicylowy lub inne NLZP (objawy: zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy); zaburzeń krzepnięcia i skazy krwotocznej; naczyniowo-mózgowego lub innego czynnego krwawienia; małopłytkowości. Nie stosować w III trymestrze ciąży oraz w trakcie przyjmowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym inhibitorów COX-2), u pacjentów odwodnionych (ciężkie odwodnienie wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów) oraz u dzieci poniżej 12. roku życia.

Sposób użycia:

Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: przyjmować 1 kapsułkę dawki początkowej. Kolejne dawki w razie potrzeby powtarzać co 3-6 godzin. Nie przekraczać 3 kapsułek (1200mg) ibuprofenu na dobę. Jeśli objawy nie ustępują po 3 dniach stosowania, dalsze przyjmowanie leku należy skonsultować z lekarzem.