

Ibum Forte 0,4g 24 kaps.



Cena: 23,49 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	400mg
Opakowanie	24 kaps. (2 blist. po 12 kaps.)
Postać	kapsułki miękkie
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Skład Ibum Forte:

Substancja czynna: ibuprofen (Ibuprofenum). Jedna kapsułka zawiera 400mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, woda oczyszczona, żółcień chinolinowa E 104, błękit patentowy E 131.

Działanie Ibum Forte:

Ibuprofen to niesteroidowy lek przeciwzapalny o potrójnym działaniu – przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Produkt leczniczy Ibum Forte jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia w krótkotrwałym stosowaniu w leczeniu bólu i gorączki różnego pochodzenia.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Ibum Forte wskazany do stosowania w leczeniu słabego lub umiarkowanego bólu – migrena, ból głowy, ból zębów, mięśni, stawów, kości, ból pourazowy, nerwobóle, ból w przebiegu przeziębienia i grypy; bolesnego miesiączkowania; stanów gorączkowych różnego pochodzenia – w przebiegu grypy i przeziębienia, innych chorób zakaźnych.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Lek zawiera żółcień chinolinową – może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera sorbitol – możliwość zastosowania leku u osób ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów należy omówić z lekarzem. Możliwość stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią należy omówić z lekarzem, przy czym nie jest zalecane stosowanie leku w pierwszym i drugim trymestrze, a w trzecim jest to przeciwwskazane.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku czynnej bądź przebytej choroby wrzodowej i/lub dwunastnicy, perforacji, krwawienia (objawy występujące także po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych). Nie stosować w przypadku, gdy wcześniej po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych

leków przeciwzapalnych występowały objawy alergii – pokrzywka, katar, astma oskrzelowa. Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby, nerek lub serca. Nie stosować równocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (m.in. inhibitory COX-2 – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Nie stosować w przypadku skazy krwotocznej. Nie stosować w trzecim trymestrze ciąży.

Działania niepożądane:

W trakcie przyjmowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Niezbyt często: ból głowy, niestrawność, ból brzucha, nudności, pokrzywka, świąd; rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia, obrzęki wynikające z zaburzeń nerek i dróg moczowych; bardzo rzadko: smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja, czasem ze skutkiem śmiertelnym (głównie u osób w podeszłym wieku, w pojedynczych przypadkach opisywano: depresję, reakcje psychiatryczne i szumy uszne, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęk; ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w surowicy (retencja sodu), zaburzenia czynności wątroby, (głównie w przypadku długotrwałego stosowania), nieprawidłowości morfologii krwi (anemia, leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza) – pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, skaza krwotoczna (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa), rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, ciężkie reakcje nadwrażliwości (m.in. obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, wstrząs, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) w trakcie stosowania ibuprofenu notowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych (w tym: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja). Podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych obserwowano także: obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca. Stosowanie ibuprofenu związane jest również z nieznacznym wzrostem ryzyka ataku serca lub udaru.

Dawkowanie kapsułek Ibum Forte:

Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazań na ulotce. Do stosowania doustnego. Dorośli, młodzież powyżej 12. roku życia: dawka początkowa – jedna kapsułka (400mg). W miarę konieczności dawkę można powtarzać co 4-6 godzin, przy czym maksymalna dawka dobową to 3 kapsułki (1200mg). Lek do krótkotrwałego stosowania. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni. Zaleca się stosować najniższą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas.