

# Ibupar Forte 0,4 g 20 tabl.powl.

Cena: 15,08 zł



## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	400mg
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabletki powlekane
Producent	PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ibuprofenum

## Opis produktu

### Skład Ibupar Forte 0,4g:

Substancja czynna: ibuprofen (Ibuprofenum). Jedna tabletkę zawiera 400mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna (101), skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa, alkohol poliwinylowy, sodu laurylosiarczan, sodu stearylofumarany; otoczkę: makrogol (4000), hypromeloza (E 5), hypromeloza (E 15), hydroksypropyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E 110) lak, czerwien koszenilowa (E 124).

### Działanie Ibupar Forte 0,4g:

Niesteroidowy lek przeciwzapalny – ibuprofen – stanowi o skuteczności działania produktu leczniczego Ibupar Forte 0,4g. Ibuprofen działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie. Lek można stosować w przypadku bolesnego miesiączkowania, gorączki różnego pochodzenia oraz bólów słabych i umiarkowanych.

### Zastosowanie:

Produkt leczniczy Ibupar Forte 0,4g wskazany do stosowania w leczeniu słabych i umiarkowanych bólów: głowy, migrenowe, zębów, kości, stawów, mięśni, pourazowe, nerwobóle, bóle w przebiegu przeziębienia i grypy, a także w leczeniu gorączki różnego pochodzenia (np. w przebiegu przeziębienia i grypy) oraz bolesnego miesiączkowania.

### Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Lek zawiera żółcień pomarańczową (E110), lak i czerwien koszenilową (E124) – lek może przyczyniać się do występowania reakcji alergicznych. U osób z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby zaleca się omówić z lekarzem możliwość stosowania leku. U odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko wystąpienia czynności nerek. Stosowanie u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży – wyłącznie ze wskazania lekarza. Możliwość stosowania leku w okresie karmienia piersią należy omówić z lekarzem.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować poniżej 12. roku życia. Nie stosować w trzecim trymestrze ciąży. Nie stosować w przypadku czynnej lub występującej w przeszłości choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy. Nie stosować w przypadku perforacji lub krwawienia (także wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych). Nie

stosować w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby, nerek, serca. Nie stosować w przypadku istniejących lub występujących w przeszłości objawów alergii (np. katar, pokrzywka, astma oskrzelowa) po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie stosować równocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (także wybiórczymi inhibitorami COX-2 – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Nie stosować w przypadku skazy krwotocznej.

#### **Działania niepożądane Ibupar Forte 0,4g:**

U niektórych osób w trakcie przyjmowania leku mogą pojawić się działania niepożądane. Mogą wystąpić: ciężkie reakcje skórne (tzw. zespół DRESS – wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofiliów. Często: wysypki, w tym plamisto-grudkowe, zmniejszenie łaknienia, obrzęki (zwykle ustępujące po odstawieniu leku). Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, bóle w nadbrzuszu, bóle kurczowe w jamie brzusznej, dyskomfort w nadbrzuszu, zgaga, ból głowy, mroczyki, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia barwnego, pokrzywka, świąd, łysienie, zespół objawów z bólami brzucha, gorączką, dreszczami, nudnościami i wymiotami, kołatanie serca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, suchość błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenia dziąseł, nieżyt nosa. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność lub senność, pobudzenie, nerwowość i uczucie zmęczenia. Bardzo rzadko: smoliste stolce, krwiste wymioty, wrzodziejące zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zaburzenia świadomości, depresja, zaburzenia emocjonalne, szumy uszne, zaburzenia słuchu, azotemia, krwimocz, niewydolność nerek, w tym ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zmniejszenie klirensu kreatyniny, wielomocz, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, zwiększenie stężenia sodu w surowicy, zaburzenia czynności wątroby, dodatnie testy czynnościowe wątroby, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania, zapalenie wątroby, żółtaczką, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, niekiedy z dodatnim odczynem Coombsa, zaburzenia w obrazie krwi (eozynofilia, leukopenia, neutropenia), małopłytkowość z plamicą lub bez, zmniejszenie stężenia hemoglobiny lub hematokrytu, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka, ostre reakcje nadwrażliwości (np.: obrzęk twarzy, języka, krtani, duszność, niedociśnienie tętnicze, częstoskurcz lub ostry wstrząs, reakcje bronchospastyczne, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli). Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, perforacja, krwawienie z przewodu pokarmowego (czasem ze skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza w przypadku osób w podeszłym wieku). Stosowanie tego leku może nieznacznie zwiększać ryzyko udaru lub zawału.

#### **Dawkowanie tabletek Ibupar Forte 0,4g:**

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Stosować doustnie, podczas posiłku lub po jego zakończeniu. Dorośli, młodzież powyżej 12. roku życia: dawka początkowa – jedna tabletkę (400mg), w miarę potrzeby dawkę można powtarzać co 4-6 godzin. Maksymalna dobową dawką: 3 tabletki (1200mg). W przypadku braku poprawy lub nasilania się objawów po 3 dniach należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku wrażenia za silnego lub za słabego działania leku należy skonsultować się z lekarzem.