

Ibuprom Sport żel 0,05 g/g 60g

Cena: 25,43 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,05 g/g
Opakowanie	60 g (tub.)
Postać	żel
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Składniki:

Substancją czynną jest ibuprofen. Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, solketal (2,2-dimetylo-4-hydroksymetylo-1,3dioksalan), poloksamer 407, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha (Miglyol 812), olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, woda oczyszczona.

Działanie:

Żel do stosowania miejscowego Ibuprom Sport 50mg/g jako substancję czynną zawiera ibuprofen, który zaliczany jest do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Mechanizm działania przeciwzapalnego i przeciwbólowego ibuprofenu polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn w obrębie tkanki objętej procesem zapalnym.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Ibuprom Sport 50mg/g żel wskazany w miejscowym leczeniu bólów mięśni; w leczeniu bólów związanych ze zwyrodnieniowymi chorobami stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa; w leczeniu zmian zapalnych tkanek okołostawowych (m.in. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgniowych, więzadeł i torebek stawowych); w leczeniu bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa i zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (m.in. stłuczenia, skręcenia).

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej nie wyższej niż 25st. C.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz u pacjentów, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego w przeszłości wystąpiły pokrzywka, alergiczne zapalenia błon śluzowych nosa i astma. Nie aplikować na otwarte rany, błony śluzowe i w okolicach oczu. Lek niewskazany do leczenia dzieci poniżej 14. roku życia.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek Ibuprom Sport może wywołać działania niepożądane. W przypadku wystąpienia zaburzeń ogólnych i stanów w miejscu podania takich jak niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne oraz wstrząs, zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie, mrowienie w miejscu podania); zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia takich jak astma, pogorszenie stanu astmatycznego, skurcz oskrzeli lub duszność; zaburzeń skóry i tkanki podskórnej takich jak wysypki różnego typu, świąd, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, plamica, choroby pęcherzowe skóry (martwica naskórka, rumień wielopostaciowy); zaburzeń nerek i dróg moczowych takich jak niewydolność nerek u pacjentów z chorobami nerek; zaburzeń żołądkowo-jelitowych takich jak bóle brzucha i niestrawność, należy bezzwłocznie przerwać stosowanie leku.

Sposób użycia:

Stosować zgodnie ze wskazaniem lekarza lub według zaleceń zawartych w ulotce. Aplikować miejscowo na skórę. O ile lekarz nie zaleci inaczej, żel należy stosować 3-4 razy dziennie. Na skórę nanieść pasek żelu długości 4-10cm (2-5g żelu), co odpowiada 100-250mg ibuprofenu, a następnie wetrzeć. Lek w razie konieczności można stosować częściej, jednak pomiędzy aplikacjami należy zachować co najmniej 4 godziny przerwy. Dawka dobową leku nie powinna przekraczać 12g żelu na dobę (600g ibuprofenu). Lek nie nadaje się do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym. Lek można stosować podczas zabiegu jonoforezy: lek stosuje się pod katodą, zalecane natężenie 0,1-0,5mA na 5cm² powierzchni elektrody, czas trwania zabiegu: maksymalnie do 15 minut. Czas trwania leczenia ustala lekarz. W przypadku nieustąpienia objawów lub ich nasilenia po 10 dniach stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.