

# Ibuvit D 600 krople doustne 600j.m.10ml



Cena: 31,15 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	600 j.m.
Opakowanie	10 ml (but.z pomp.)
Postać	krople doustne
Producent	MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestracja	Suplement diety

## Opis produktu

### Składniki:

Kompozycja średniołańcuchowych triglicerydów (MCT) pochodzących z oleju palmowego i kokosowego, witamina D (cholekalcyferol – witamina D3).

Zawartość składników w jednym naciśnięciu pompki (zalecana dzienna porcja): witamina D – 15mcg (600j.m.; 300% referencyjnej wartości spożycia).

### Działanie:

Preparat ma postać kropli, dzięki czemu łatwo jest odmierzać odpowiednią dzienną porcję, odmierzanie ułatwia precyzyjna pompka dozująca. Suplement diety Ibuvit D 600 Krople z pompką dozującą uzupełnia codzienną dietę niemowląt i dzieci w witaminę D. Jest ona potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Ponadto wspiera prawidłowe wchłanianie i wykorzystanie wapnia i fosforu, pomaga także utrzymać odpowiedni poziom wapnia we krwi. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i wspiera utrzymanie zdrowych zębów.

### Zastosowanie:

Suplement diety Ibuvit D 600 Krople z pompką dozującą przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety w witaminę D. Do stosowania u niemowląt od 6. miesiąca życia i dzieci do 10. roku życia.

### Informacje dodatkowe:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

### Sposób użycia:

Zalecana dzienna porcja: jedno naciśnięcie dozownika. Preparat podawać bezpośrednio do ust dziecka lub do przygotowanej wcześniej

porcji mleka. Należy unikać kontaktu dozownika z ustami i mlekiem. Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 1 dawki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.