

## Imodium Instant 12 tabl.



Cena: 29,26 zł

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	2 mg
Opakowanie	12 tabletek
Postać	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Loperamidum

### Opis produktu

#### Składniki:

Substancja czynna: 2 mg chlorowodoru loperamidu.

#### Działanie:

Loperamid zmniejsza perystaltykę jelit, wydłuża czas przechodzenia treści pokarmowej przez jelita. Loperamid zwiększa spoczynkowe napięcie zwieracza odbytu, jednocześnie zmniejszając natychmiastową potrzebę wypróżnienia (parcie na stolec).

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować w następujących przypadkach: u dzieci w wieku poniżej 6 lat, nadwrażliwość (alergii) na którykolwiek składnik produktu, w leczeniu wstępnym ostrej czerwonki bakteryjnej, u pacjentów z ostrym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego, gdy nie jest wskazane zwolnienie perystaltyki jelit, w fenyloketonurii; podawanie leku musi być przerwane w przypadku wystąpienia zapań, wzdęcia lub rozwijającej się niedrożności.

#### Sposób użycia:

Tabletkę należy położyć na języku, poczekać aż się rozpuści i połknąć ze śliną.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ostra biegunka - początkowa dawka to 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletki (2 mg) dla dzieci, a następnie 1 tabletki po każdym luźnym stolcu; biegunka przewlekła – początkowa dawka to 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletki (2 mg) na dobę dla dzieci, aż do uzyskania 1 do 2 normalnych stolców na dobę; dawka maksymalna – w biegunce ostrej i przewlekłej wynosi 8 tabletek na dobę dla dorosłych; w przypadku dzieci dobowa dawka maksymalna wynosi 3 tabletki/20 kg masy ciała na dobę.