


Inovox Express pomarańczowa 24 pastylki do ssania



Cena: 33,93 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	2mg, 2mg+0, 6mg+1
Opakowanie	24 pastylki
Postać	pastylki twarde do ssania
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	alcohol benzylicus, amylmetacresolum, Lidocainum

Opis produktu

Skład

Substancjami czynnymi leku są lidokainy chlorowodorek, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy.

Jedna pastylka twarda zawiera:

Lidokainy chlorowodoru - 2,00 mg,

Amylometakrezol - 0,60 mg,

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy - 1,20 mg.

Substancje pomocnicze: lewomentol, sacharyna sodowa (E954), sacharoza, glukoza ciekła, żółcień pomarańczowa (E110), czerwień koszenilowa (E124), kwas cytrynowy jednowodny (E330), aromat pomarańczowy.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Inovox Express stosuje się doustnie.

Nie umieszczać pomiędzy dziąsłem a policzkiem.

Leku nie zaleca się stosować dłużej niż 5 dni. Dłuższe stosowanie może wpłynąć na naturalną florę bakteryjną występującą w gardle.

Jeśli po tym czasie nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: co 2 do 3 godzin powoli rozpuszczać w jamie ustnej jedną pastylkę.

Stosować maksymalnie do 8 pastylek w ciągu 24 godzin (maksymalnie 4 pastylki u młodzieży).

Działanie

Inovox Express zawiera antyseptyki — amylometakrezol i alkohol 2,4-dichlorobenzylowy. Substancje te działają przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. W badaniach wykazują również działanie przeciwwirusowe. Dzięki temu działaniu lek zmniejsza ból gardła i trudności w przełykaniu. Dodatkowo zawarta w nim lidokaina szybko uśmierza ból po zastosowaniu leku.

Wskazania

miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej,
łagodzenie objawów bólu gardła.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Inovox Express:

Jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainy chlorowodorek lub inne amidowe miejscowe środki znieczulające, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (nie częściej niż u 1 osoby na 1000):

reakcje nadwrażliwości (pieczenie, świąd),
obrzęk naczynioruchowy,
pieczenie w gardle i nieprzyjemny smak.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek może powodować drętwienie języka i zwiększać ryzyko ugryzienia się.

Przed zastosowaniem u astmatyków należy skontaktować się z lekarzem.

Należy przestrzegać zalecanego dawkowania: lek przyjmowany w dużych dawkach lub długotrwale, może wpływać na serce lub układ nerwowy i może powodować drgawki.

Leku nie należy stosować, jeśli w jamie ustnej i gardle występują większe niezagojone rany.

Lek może być szkodliwy dla zębów.