

KENAY NAC N-acetylo-L-cysteina 60 kaps.



Cena: 18,48 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	150mg
Opakowanie	60 kaps.
Postać	Kapsułki
Producent	KENAY A.G. ANDRZEJ GRZEGOREK
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	N-Acetylocysteina
Zastosowanie	Antyoksydant

Opis produktu

KENAY NAC N-acetylo-L-cysteina 60 kaps.

N-acetylocysteina, często opatrywana skrótem NAC, to aminokwas znajdujący naturalnie w niewielkich ilościach, w produktach spożywczych o wysokiej zawartości białka. NAC jest pochodną cysteiny – jednego z aminokwasów budujących białka. Po spożyciu i przeniknięciu do organizmu, NAC przekształca się w przewadze w cysteinę. W odróżnieniu jednak od samej cysteiny, z uwagi na cechy budowy, NAC lepiej przenika od tkanek i lepiej wysyca je cysteiną. To ważne dla naszych tkanek, ponieważ rola cysteiny wykracza daleko poza funkcję cegiełki służącej do budowania białek.

Cysteina jest np. niezbędna do wytwarzania glutationu i podnosi stężenie tego związku w naszych tkankach, zaś glutation to podstawowy element układu antyoksydacyjnego organizmu, chroniący tkanki przed niszczyielską aktywnością wolnych rodników tlenowych. I właśnie w zdolności do stymulacji syntezy glutationu w tkankach ujawnia się m.in. przewaga NAC nad zwykłą cysteiną.

Wykazano np., że N-acetylocysteina przekracza po jej podaniu doustnym barierę krew-mózg i zwiększa stężenie glutationu ogólnie w tkance nerwowej, a szczególnie w tkance nerwowej mózgu.

Korzyści i cechy produktu:

- podstawowy element układu antyoksydacyjnego organizmu
- ekologiczne szklane opakowanie

Składniki:

N-acetylo-L-cysteina; inulina; kapsułka: hydroksypropylometyloceluloza

Porcja dzienna:
1 kapsułka

Opakowanie zawiera:
60 kapsułek

Skład w porcji dziennej (1 kapsułka):
NAC (N-acetylo-L-cysteina) 150 mg

Sposób użycia:
1 kapsułka dziennie

Sposób przechowywania:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci

Uwagi:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. Preparatu nie powinny stosować kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia.

Producent: Kenay Sp. J.