

Laremid 2mg 10 tabl.

Cena: 14,73 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	2 mg
Opakowanie	10 tabletek (blist.)
Postać	tabletki
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Loperamidum

Opis produktu

Składniki:

1 tabletką zawiera:

Chlorowodorek loperamidu 2 mg

Substancje pomocnicze:

laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, kwas stearynowy

Działanie:

Zawarty w preparacie loperamid hamuje motorykę jelit działając bezpośrednio na mięśnie gładkie ściany jelita, zmniejsza wydzielanie nabłonka jelitowego. Lek zwalnia szybkość pasażu treści jelitowej przez przewód pokarmowy, zmniejsza liczbę wypróżnień i poprawia konsystencję stolca.

Lek znajduje zastosowanie w objawowym leczeniu biegunek ostrych i przewlekłych różnego pochodzenia. W leczeniu biegunki w przebiegu zaburzeń czynnościowych jelit. W lekkich zaostrzeniach nieswoistych zapaleń jelit. U pacjentów po operacjach, u których dokonano przetoki jelitowej.

Przeciwwskazania:

Leku nie należy podawać w stanach niedrożności jelit, w zaparciach, w ciężkim rzucie zapaleń nieswoistych jelit. Lek nie powinien być podawany dzieciom do 2 roku życia

Sposób użycia:

Lek podaje się w dawce i z częstotliwością ustaloną przez lekarza.

Zwykle podaje się: początkowo w ostrej biegunce 2 tabletki, a następnie 1 tabletkę po każdym nieprawidłowym wypróżnieniu.

Maksymalna dawka leku nie może przekraczać 8 tabletek na dobę. W biegunce przewlekłej zwykle na początku podaje się 2 razy po 1 tabletkę, w razie potrzeby zwiększając dawkę do 4-6 na dobę.