

## Lioton 1000 żel 8,5 mg (1000 j.m.) 30g



Cena: 38,71 zł

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	5 mg/g, 8
Opakowanie	30 g
Postać	żel
Producent	BERLIN-CHEMIE AG
Rejestracja	
Substancja czynna	Heparinum

### Opis produktu

#### Skład:

Substancja czynna: heparyna sodowa (Heparinum natricum). 1g żelu zawiera 8,5mg (1000IU) heparyny sodowej oraz substancje pomocnicze: karbomer 940, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, trietanoloamina, woda oczyszczona.

#### Działanie:

Substancją czynną wykorzystaną w produkcie leczniczym Lioton 1000 żel jest heparyna sodowa. Lek zaleca się stosować jako wsparcie w leczeniu chorób żył powierzchniowych oraz stłuczeń, krwiaków i obrzęków. Heparyna działa miejscowo przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie oraz przeciwobrzękowo. Przeciwdziała ona powstawaniu powierzchniowych zakrzepów oraz sprzyja rozpuszczaniu istniejących zakrzepów. Przyczynia się do szybszego wchłaniania krwiaków. Preparat łagodzi ból oraz zmniejsza uczucie napięcia.

#### Zastosowanie:

Produkt leczniczy Lioton 1000 żel wskazany do stosowania wspomagająco w przypadku chorób żył powierzchniowych, zakrzepowego zapalenia żył, zespołu objawów żylakowości, żylaków kończyn dolnych, a także w przypadku stłuczeń, krwiaków oraz obrzęków. Do stosowania w zapobieganiu i leczeniu przerostłych blizn oraz bliznowców.

#### Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Stosowanie w okresie ciąży i laktacji należy omówić z lekarzem.

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku, w tym alergii na parabeny. Nie stosować na krwawiące, sączące, otwarte rany. Nie stosować w okolicy oczu, ust i nosa. Nie stosować w przypadku krwawienia. Nie stosować poniżej 12. roku życia. Nie stosować doustnie.

#### Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Notowano pojedyncze przypadki występowania

objawów reakcji alergicznych lub pseudoalergicznych. U osób z pierwotnie występującą czerwienicą prawdziwą po miejscowym podaniu heparyny mogą pojawić się zmiany skórne.

**Dawkowanie:**

Stosować według zaleceń lekarza lub według wskazówek na ulotce. Lek aplikować 1-3 razy na dobę. Rozprowadzać na skórę w miejscu zmienionym chorobowo, delikatnie wmasować do wchłonięcia żelu. Obrzęki po urazach: stosować do 10 dni. Choroby żył powierzchniowych: stosować 1-2 tygodnie.