

Maalox 0,4g+0,4g 40 tabl.



Cena: 27,44 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0, 4g, 4g+0
Opakowanie	40 tabletek (4 blist. po 10 tabl.
Postać	tabletki
Producent	SANOFI AVENTIS FRANCE
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Aluminium hydroxidum, magnesium hydroxide

Opis produktu

Składniki:

1 tabletką zawiera 400 mg wodorotlenku magnezu i 400 mg wodorotlenku glinu; substancje pomocnicze: mannitol, sorbitol, sacharyna sodowa, aromat miętowy, stearynian magnezu, sacharoza, sacharoza zawierająca 3% skrobi

Działanie:

Maalox to preparat złożony, zawierający wodorotlenki glinu i magnezu o miejscowym działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu w żołądku. Działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy poprzez zwiększenie warstwy śluzu, wzrost wydzielania wodorowęglanów, a wzrost syntezy prostaglandyn ma działanie cytoprotekcyjne na śluzówkę żołądka. Działa lekko ściągająco i przeciwzapalnie. Działa miejscowo, praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Jego działanie jest szybkie i długotrwałe.

Wskazania:

Leczenie objawowe związanych z nadkwaśnością zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego: nieżyty żołądka, zarzucania wstecznego treści żołądkowej do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony, niestrawność (zgaga) z powodu nadkwaśności. Wspomagająco w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy, choroby wrzodowej żołądka.

Środki ostrożności:

Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie oraz u dzieci poniżej 6 r.ż., zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek. Tabletki zawierają sacharozę - ostrożnie stosować u chorych z cukrzycą.

Ciąża i okres karmienia piersią:

Można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią w zalecanych dawkach i zgodnie ze wskazaniami. Nie należy stosować długotrwałe.

Działanie niepożądane:

Możliwe zaparcia, biegunki, nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca. Po długotrwałym stosowaniu przy niedostatecznej podaży fosforanów objawy hipofosfatemii oraz niewydolność nerek (na skutek odkładania się fosforanu amonowo-magnezowego), a u chorych dializowanych może spowodować lub nasilić osteomalację, a także zwiększyć ryzyko encefalopatii.

Sposób użycia:

Doustnie: 1 łyżka stołowa (10 ml) lub saszetka lub 1-2 tabl. na 90 min. po posiłku lub w czasie bólu. Tabletki należy ssać lub żuć.