

Maalox zawiesina doustna 250ml



Cena: 28,13 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(0,035g+0,04g)/ml
Opakowanie	250 ml
Postać	zawiesina doustna
Producent	SANOFI AVENTIS FRANCE
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Aluminium hydroxidum, magnesium hydroxide

Opis produktu

Składniki:

1 tabl. zawiera 400 mg wodorotlenku magnezu i 400 mg wodorotlenku glinu. 100 ml zawiesiny zawiera 4 g wodorotlenku magnezu i 3,5 g wodorotlenku glinu (1 saszetka zawiera 15 ml zawiesiny).

Działanie:

Maalox to preparat złożony, zawierający wodorotlenki glinu i magnezu o miejscowym działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu w żołądku. Działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy poprzez zwiększenie warstwy śluzu, wzrost wydzielania wodorowęglanów, a wzrost syntezy prostaglandyn ma działanie cytoprotekcyjne na śluzówkę żołądka. Działa lekko ściągająco i przeciwzapalnie. Działa miejscowo, praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Jego działanie jest szybkie i długotrwałe.

Wskazania:

Leczenie objawowe związanych z nadkwaśnością zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego: nieżyty żołądka, zarzucania wstecznej treści żołądkowej do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony, niestrawność (zgaga) z powodu nadkwaśności. Wspomagająco w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy, choroby wrzodowej żołądka.

Środki ostrożności:

Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie oraz u dzieci poniżej 6 r.ż., zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek. Tabletki zawierają sacharozę - ostrożnie stosować u chorych z cukrzycą. Można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią w zalecanych dawkach i zgodnie ze wskazaniami. Nie należy stosować długotrwałe.

Działanie niepożądane:

Możliwe zaparcia, biegunki, nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca. Po długotrwałym stosowaniu przy niedostatecznej podaży fosforanów objawy hipofosfatemii oraz niewydolność nerek (na skutek odkładania się fosforanu amonowo-magnezowego), a u chorych dializowanych może spowodować lub nasilić osteomalację, a także zwiększyć ryzyko encefalopatii.

Sposób użycia:

Doustnie: 1 łyżka stołowa (10 ml) lub saszetka lub 1-2 tabl. na 90 min. po posiłku lub w czasie bólu. Tabletki należy ssać lub żuć. Dawka

maksymalna - 140 ml zawiesiny na dobę.