

MBE 60 kaps.



Cena: 23,42 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	, 15g mg2+7, 29mg+0, 2g
Opakowanie	60 kapsułek (4x15)
Postać	kapsułki miękkie
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	magnesii oxidum, Pyridoxinum, Tocopherolum

Opis produktu

Skład:

1 kaps. elastyczna zawiera 150 mg Mg²⁺ (w postaci tlenku magnezu), 7,29 mg chlorowodoru pirydoksyny (witamina B6), 200 mg octanu dl-a tokoferolu (witamina E).

Substancje pomocnicze:

olej sojowy oczyszczony, lecytyna sojowa, olej kokosowy, olej palmowy, wosk pszczeli, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek.

Działanie:

Preparat witaminowo-mineralny. Witamina E - dzięki swym właściwościom przeciwutleniającym - zmniejsza ryzyko choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy i innych chorób o etiologii powiązanej ze stresem oksydacyjnym, zwłaszcza u osób przebywających w środowisku skażonym, palących papierosy i narażonych na stres. W wyniku redukcji wolnych rodników witamina E przeciwdziała wywoływanym przez nie uszkodzeniom błon komórkowych (w tym krwinek czerwonych) i materiału genetycznego komórki. Magnez - podstawowy regulator cyklu komórkowego - bierze udział w wielu reakcjach enzymatycznych, m.in. reakcjach oksydoredukcyjnych, przemianie węglowodanowej, białkowej i lipidowej. Odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, chroni go przed niedotlenieniem i niedokrwieniem, a także zapobiega zwapnieniu ścian naczyń krwionośnych. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego i jego wykorzystanie o 20-40%, ułatwiając transport do komórek i utrzymując stężenie magnezu na optymalnym poziomie. Ponadto bierze m.in. udział w syntezie białek oraz wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu krwiotwórczego i o.u.n.

Wskazania:

Profilaktyka oraz uzupełnianie niedoborów witaminy E, magnezu i witaminy B6. Profilaktyka miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca, zwłaszcza u osób narażonych na stres, przebywających w zanieczyszczonym środowisku i palących papierosy.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu, hipermagnezemia, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy, miastenia, znaczna hipotensja. Nie stosować u pacjentów leczonych lewodopą bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.

Ciąża i okres karmienia piersią:

Stosować ostrożnie.

Interakcje:

Fosforany, duże dawki wapnia, nadmiar lipidów, fityniany zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Magnez zmniejsza wchłanianie związków żelaza (ponadto siarczan żelaza osłabia działanie witaminy E - należy zachować kilkugodzinny odstęp między podaniem obu leków), związków fluoru oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny. Preparat może działać antagonistycznie do witaminy K, zwłaszcza u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub estrogenami. Duże dawki witaminy B6 osłabiają skuteczność lewodopy u pacjentów przyjmujących lewodopę bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.

Dawkowanie:

Dorośli doustnie, profilaktycznie: 1 kaps. raz dziennie; leczniczo: 1 kaps. 2 razy dziennie (ewentualnie dawkę można zwiększyć w zależności od stopnia niedoboru).