

## Mel 7,5mg 20 tabl.

Cena: 20,30 zł



### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	7,5 mg
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Meloxicamum

### Opis produktu

#### Skład:

1 tabletkę zawiera: substancję czynną – meloksykam (Meloxicamum) – 7,5mg oraz substancje pomocnicze: betadeks, aromat malinowy SD0621M, aromat truskawkowy SD1634, aromat waniliowy SD1333, sodu cytrynian bezwodny, aspartam (E 951), Pearlitol Flash (d-mannitol, skrobia kukurydziana, woda oczyszczona), Ludiflash (octan poliwinylu, powidon K30, krospowidon (typ B), d-mannitol, woda oczyszczona), krospowidon (typ B), sodu stearylofumarany, acesulfam potasowy (E 950).

#### Działanie:

Jest to lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym oraz przeciwgorączkowym. Substancją czynną jest meloksykam należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działanie leku oparte jest na preferencyjnym hamowaniu cyklooksygenazy COX-2 w stosunku do COX-1.

#### Zastosowanie:

Lek Mel 7,5mg wskazany do stosowania w bólach kostno-stawowych oraz mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych oraz zwyrodnieniowych stawów. Do krótkotrwałego przyjmowania w leczeniu zaostrzonych objawów chorób reumatoidalnych (reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa)

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia na meloksykam, inną substancję zawartą w leku lub na aspirynę, a także inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nie stosować w przypadku występowania niektórych objawów (np. astma, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka) po zastosowaniu aspiryny lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie stosować u kobiet w trzecim trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią; u dzieci poniżej 15. roku życia. Przeciwwskazaniem do stosowania leku są: krwawienie z przewodu pokarmowego (z żołądka lub z jelit) lub perforacja żołądka lub jelit będąca następstwem leczenia NLPZ; czynna, przebyta lub nawracająca choroba wrzodowa lub krwawienie z żołądka i/lub dwunastnicy; ciężkie zaburzenia czynności wątroby, ciężka niewydolność nerek u osób niedializowanych; ciężka niewydolność serca; krwawienia w obrębie mózgu lub inne krwawienia.

#### Działania niepożądane:

W trakcie przyjmowania leku Mel mogą występować objawy niepożądane: reakcje skórne (swędzenie, powstawanie pęcherzy, łuszczenie się skóry, rumień wielopostaciowy), obrzęk skóry oraz błon śluzowych; duszności, napady astmy; zapalenie wątroby oraz towarzyszące mu objawy: zażółcenie skóry i gałek ocznych, ból brzucha, utrata apetytu; objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, a w szczególności: krwawienie, owrzodzenia przewodu pokarmowego.

**Dawkowanie:**

Przyjmować 1 tabletkę na dobę. Umieścić ją na języku i poczekać aż się rozpuści, następnie połknąć. Jeśli zachodzi taka konieczność można dodatkowo popić wodą. Bez konsultacji z lekarzem nie powinno się stosować leku dłużej niż 7 dni.