

Metafen 0,2g+0,325g 50 tabl.

Cena: 33,74 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	200mg + 325mg
Opakowanie	50 tabl.
Postać	tabletki
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ibuprofenum, Paracetamolum

Opis produktu

Skład:

Każda tabletkę zawiera: substancję czynną: ibuprofen – 200mg, paracetamol – 325mg. Substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Działanie:

Lek doustny Metafen działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Zawiera aż dwie substancje aktywne. Jedną z nich jest ibuprofen należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), który wykazuje obwodowe działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, a także przeciwzapalne. Natomiast paracetamol posiada ośrodkowe działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Zastosowanie:

Metafen to lek przeznaczony do stosowania w przypadku różnego rodzaju bólów: głowy, migreny, zębów, mięśni, kości i stawów, bólów menstruacyjnych, lędźwiowo-krzyżowych, pourazowych i nerwobóli oraz gorączki w przebiegu infekcji wirusowych, przeziębienia i innych chorób. Lek przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia na paracetamol, ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku oraz na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowania w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego, skurczu oskrzeli, nieżyty nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ, ciężkiej niewydolności nerek i/lub wątroby, choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie); perforacji lub krwawień, również tych występujących po zastosowaniu leków z grupy NLPZ; ciężkiego nadciśnienia tętniczego, ciężkiej choroby układu sercowo-naczyniowego, tachykardii (przyspieszonej akcji serca), dławicy piersiowej, ciężkiej niewydolności serca; ciąży i karmienia piersią; jednoczesnego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych oraz w skazy krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry i błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego); zatrzymania moczu, jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2 oraz u pacjentów, u których występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej; u dzieci poniżej 12 lat, w przypadku choroby alkoholowej.

Działanie niepożądane:

Podczas stosowania leku Metafen mogą wystąpić działania niepożądane. Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, bóle głowy, pokrzywka i świąd, wymioty i biegunka. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, szumy uszne, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia, pokrzywka, rumień, zapalenie skóry. Bardzo rzadko: zaburzenia wskaźników morfologii krwi; powiększenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby; rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozplywna naskórka; wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroba Crohna, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, smołowate stolce, krwawe wymioty szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat; u osób nadwrażliwych mogą wystąpić ciężkie reakcje uczuleniowe, jak: obrzęk twarzy, języka, krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, wstrząs, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli; u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi podczas leczeniem ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, takich jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja.

Dawkowanie:

Do stosowania doustnego. Dorośli: jednorazowa dawka 1-2 tabletki, w razie konieczności przyjmować do trzech razy na dobę, jednak nie przekraczać dawki dobowej 6 tabletek. Dzieci w wieku powyżej 12 lat: przyjmować jednorazowo 1 tabletkę, w razie potrzeby powtarzać dawkę do trzech razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.