

## Migea 0,2 g 4 tabl.



Cena: 34,90 zł

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	200mg
Opakowanie	4 tabl.
Postać	tabletki
Producent	SANDOZ GMBH
Rejestracja	
Substancja czynna	Acidum tolfenamicum

### Opis produktu

#### Dawkowanie:

Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 tabletkę po wystąpieniu pierwszych objawów ostrego napadu migreny. Jeśli nie nastąpi poprawa, dawkę tę można powtórzyć po upływie 1 do 2 godzin.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

#### Działanie:

Migea zawiera kwas tolfenamowy, który należy do leków z grupy NLPZ. Kwas tolfenamowy wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

#### Skład:

1 tabletkę zawiera 200 mg kwasu tolfenamowego.

Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), makrogol 6000, kwas alginowy, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran.

#### Działania niepożądane:

Bardzo często występujące działania niepożądane (u 1 na 10 osób lub częściej):

wymioty, ból brzucha, niestrawność,  
wysypka,  
cytrynowe zabarwienie moczu, uczucie pieczenia podczas oddawania moczu,  
ból głowy, zawroty głowy, uczucie zmęczenia,  
zaburzenia czynności wątroby.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

wzdęcia, uczucie pełności, zaparcia,  
nasilone pocenie się, mrowienie, dezorientacja,  
zaczerwienienie twarzy.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

szумы uszne, bezsenność, niepokój,  
skurcz oskrzeli, napady astmy, duszność.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

wrzód żołądka i/lub dwunastnicy, zaostrzenie zapalenia jelit,  
niewydolność serca, obrzęki,  
nadwrażliwość na światło, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze,  
niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza.

Częstość nieznana:

zaburzenia widzenia,  
obrzęk naczynioruchowy,  
zespół mocznicowy, niewydolność nerek.

#### **Przeciwwskazania:**

Kiedy nie stosować leku Migea:

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,  
jeśli stwierdzono u pacjenta astmę lub jeśli po zażyciu leku Migea, leku podobnie działającego (inne leki z grupy NLPZ, salicylany)  
wystąpił napad astmy, pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego,  
w przypadku ciężkiej niewydolności serca, nerek, wątroby,  
w przypadku czynnego krwawienia z przewodu pokarmowego, naczyń mózgowych, innego krwawienia,  
w przypadku stwierdzonej czynnej bądź w przeszłości choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy z towarzyszącym krwawieniem  
będącym efektem m.in. stosowania NLPZ,  
III trymestr ciąży,  
u osób poniżej 18 lat.

#### **Interakcje**

Migea może wchodzić w interakcje z:

metotreksatem,  
litem,  
kortykosteroidami,  
innymi lekami przeciwbólowymi i innymi lekami NLPZ,  
lekami moczopędnymi,  
lekami obniżającymi nadmierne ciśnienie tętnicze,  
lekami przeciwzakrzepowymi,  
lekami przeciwdepresyjnymi (SSRI),  
glikozydami naparstnicy,  
lekami przeciwpadaczkowymi,  
doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi,  
lekami zubożniającymi sok żołądkowy.