

# MULTI-GYN ACTIGEL Żel

Cena: 69,56 zł



## Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	50 ml
Postać	żel
Producent	QPHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Zastosowanie	Dla kobiet

## Opis produktu

Multi-Gyn ActiGel oparty jest na opatentowanym kompleksie 2QR. Ta naturalna substancja pochodzenia roślinnego w bezpieczny i naturalny sposób chroni tkanki przed szkodliwymi bakteriami. Multi-Gyn ActiGel wspiera również naturalny proces leczenia. Przywraca optymalną kwasowość pochwy (wartość pH), które wspiera rozwój pożytecznych bakterii (pałeczek kwasu mlekowego) optymalizując florę bakteryjną pochwy. Daje ulgę bezpośrednio po aplikacji. Redukuje nieprzyjemny zapach i upławy. Łagodzi świąd i pieczenie pochwy. Jest to delikatne i wysoce skuteczne leczenie bez znanych szkodliwych działań niepożądanych.

### Wskazania

Preparat polecany przy dolegliwościach związanych z bakteryjnym zakażeniem pochwy:

- szare upławy,
- nieprzyjemny zapach,
- świąd,
- podrażnienia i tkliwość,
- zaczerwienienie i bolesność.

### Składniki:

Multi-Gyn ActiGel jest preparatem naturalnym opartym na opatentowanym kompleksie 2QR\*.

Preparat nie zawiera substancji zapachowych, hormonów ani składników pochodzenia zwierzęcego.

Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer\*, Xanthan Gum, Glycerin, Caprylyl Glycol

\*2QR: 2QR - opatentowany składnik oczyszczony z Aloe Barbadensis.

### Sposób stosowania:

• W leczeniu bakteryjnego zakażenia pochwy (BV) należy douchowo aplikować obfitą ilość preparatu Multi-Gyn ActiGel co najmniej dwa razy dziennie przez okres co najmniej 5 dni. Zaleca się aplikację przed snem.

• W przypadku dolegliwości pochwowych takich jak świąd i podrażnienia należy aplikować obfitą ilość preparatu Multi-Gyn ActiGel co najmniej raz dziennie lub każdorazowo gdy pojawią się objawy.

Preparat Multi-Gyn ActiGel nie powinien być stosowany przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni. Umożliwi to samoregulację flory

bakteryjnej pochwy bez dodatkowego wsparcia. Jeśli dolegliwości utrzymują się bądź nawracają, należy skontaktować się z lekarzem.

**Ostrzeżenia i inne informacje:**

- Alergie na składniki występujące w Multi-Gyn ActiGel są bardzo rzadkie. Jeśli masz jednak wątpliwości, nałóż niewielką ilość żelu na wewnętrzną część przedramienia. Gdy pojawią się swędzące czerwone kropki lub plamy, radzimy powstrzymać się od stosowania Multi-Gyn ActiGel.
- Nie są znane żadne przeciwwskazania do stosowania Multi-Gyn ActiGel w czasie ciąży i karmienia piersią. Porozmawiaj z lekarzem o możliwościach odpowiednich dla ciebie.
- Po zastosowaniu produktu może wystąpić uczucie pieczenia i / lub mrowienia. To doznanie jest normalne i szybko ustępuje.

To jest wyrób medyczny. Należy go używać zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent: Caro Pharma, Holandia**

Informacji o preparacie udziela: Qpharma Sp. z o.o., ul. Wichrowa 7F/10, 04-682 Warszawa, tel. (022) 590 57 00, fax (022) 590 57 01, qpharma@qpharma.pl, www.qpharma.pl

Galeria

**Multi-Gyn ActiGel®**  
– intymny z natury!

Producent prowadzący reklamę: Qpharma Sp. z o.o. Producent: BIOCELINIE

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Czy wiesz, że...

**75%**

kobiet co najmniej **raz w życiu** cierpi na infekcje okolic intymnych\*

**Jak sobie z nimi radzić NATURALNIE?**

\*raport Kobieta i Intymność - www.naturalniedzielnik.pl

**Multi-Gyn ActiGel®**  
– intymny z natury!

Dlaczego **Multi-Gyn ActiGel®** na infekcje intymne?

W 100% naturalny skład

Delikatny skład bez substancji zapachowych, konserwantów i hormonów

Szybka ulga w dolegliwościach intymnych (świąd, upławy, nieprzyjemny zapach)

Zapewnia równowagę flory bakteryjnej pochwy

Wygodna aplikacja

- ✓ Redukuje nieprzyjemny zapach
- ✓ Zapewnia bezpośredni łagodzący efekt
- ✓ Optymalizuje pH i florę bakteryjną pochwy

**Multi-Gyn ActiGel®**  
– intymny z natury!

**Multi-Gyn ActiGel®** zawiera innowacyjny kompleks 2QR bioaktywnych polisacharydów uzyskiwanych z *Aloe Barbardensis*

**Stosowanie:**

- ▶ Dopuszczalno, co najmniej **2 razy dziennie przez okres co najmniej 5 dni**. Zaleca się aplikację przed snem.
- ▶ Dopuszczalno lub zewnętrznie – każdorazowo, gdy pojawią się objawy, takie jak **świąd, podrażnienia**.