

Naxii 0,22g 20 tabl.

Cena: 22,99 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	220mg
Opakowanie	20 tabl. (blist.)
Postać	tabletki powlekane
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Naproxenum

Opis produktu

Skład:

1 tabletki powlekana zawiera: substancję czynną – sól sodową naproksenu – 220mg oraz substancje pomocnicze: skład rdzenia – talk, powidon, laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna; skład otoczki – opadry Ligth Blue YS-2-10657 (hydroksypropylometyloceluloza, glikol propylenowy, dwutlenek tytanu i lak aluminiowy z indygotyną).

Działanie:

Sól sodowa naproksenu to substancja czynna leku Naxii. Lek ten działa przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Lek charakteryzuje się długotrwałym działaniem, można stosować do łagodzenia objawów bólowych różnego pochodzenia.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Naxii wskazany do stosowania w leczeniu dolegliwości bólowych, przy bólach reumatycznych, menstruacyjnych, bólach pleców, mięśni, głowy, zębów oraz bólów związanych z przeziębieniem, a także przy gorączce.

Informacje dodatkowe:

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Lek może niekorzystnie oddziaływać na płodność u kobiet, jest to działanie ustępujące po zakończeniu leczenia.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub inne substancje pomocnicze zawarte w leku. Nie stosować w przypadku: występujących wcześniej objawów uczulenia na którykolwiek składnik preparatu, stwierdzonej nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy lub inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); równoczesnego przyjmowania innych leków NLPZ; czynnej (nieдавно przebytej) choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, skazy krwotocznej, ciężkiej niewydolności wątroby, ciężkiej niewydolności nerek. Nie stosować u kobiet karmiących piersią oraz u dzieci poniżej 12. roku życia.

Działania niepożądane:

Podczas przyjmowania leku mogą wystąpić objawy niepożądane: zaburzenia żołądka i jelit: częste: bóle brzucha, nudności, zaparcia, zgaga; niezbyt częste: biegunka, niestrawność, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; rzadkie: krwawienie lub perforacje przewodu

pokarmowego niezbyt okężnicy, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy z krwawieniem lub perforacją, wymioty, wymioty z krwią; zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: rzadkie: żółtaczką, zapalenie wątroby; zaburzenia układu nerwowego: częste: ból głowy, senność, zawroty głowy; niezbyt częste: uczucie oszołomienia, bezsenność; bardzo rzadkie: drgawki, zapalenie opon mózgowych; zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: niezbyt częste: bóle lub osłabienie siły mięśniowej; zaburzenia psychiatryczne: rzadkie: depresja, niezwykle sny; zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: częste: obrzęki; rzadkie: ogólne złe samopoczucie, trudności w koncentracji, dreszcze, gorączka; zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: częste: świąd, wybroczyny, wysypka, nadmierne pocenie; niezbyt częste: plamica; rzadkie: nadwrażliwość na światło, łysienie, toksyczna rozptywna martwica naskórka; zaburzenia ucha i błędnika: częste: szumy uszne; niezbyt częste: zaburzenia słuchu; rzadkie: niedosłuch; zaburzenia oka: niezbyt częste: zapalenie nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, zmętnienie rogówki; zaburzenia serca: częste: duszność; niezbyt częste: kołatanie serca; rzadkie: niewydolność serca; zaburzenia naczyń: nadciśnienie; zaburzenia metabolizmu i odżywiania: częste: nadmierne pragnienie; rzadkie: hiperkaliemia; zaburzenia nerek i dróg moczowych: rzadkie: kłębuszkowe zapalenie nerek, krwimocz, martwica brodawek nerkowych, niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy; zaburzenia krwi i układu chłonnego: rzadkie: agranulocytoza, eozynofilia, granulocytopenia, leukopenia, trombocytopenia; zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: rzadkie: eozynofilowe zapalenie płuc; zaburzenia układu rozrodczego i piersi: rzadkie: zaburzenia miesiączkowania; zaburzenia układu immunologicznego: rzadkie: reakcje anafilaktyczne.

Dawkowanie:

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazań na ulotce. Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: stosować 1 tabletkę co 8-12 godzin. Można również zażyć 2 tabletki jako dawkę początkową, a następnie 1 tabletkę co 12 godzin. Nie zaleca się stosować więcej niż 3 tabletki na dobę, chyba że lekarz zaleci inaczej. Osoby w podeszłym wieku: zaleca się przyjmować 1 tabletkę co 12 godzin, chyba że lekarz zaleci inaczej. W przypadku dzieci poniżej 12. roku życia nie należy podawać leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.