


Neosine Forte syrop 0,5 g/5ml 100ml



Cena: 27,63 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0, 5 g/5ml
Opakowanie	100 ml
Postać	syrop
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Inosinum pranobexum

Opis produktu

Składniki:

inozyna pranobeks (inosinum pranobexum)

Wskazania:

- pomocniczo u pacjentów o obniżonej odporności, w sytuacji powracających infekcji górnych dróg oddechowych,
- zakażenia skóry i błon śluzowych spowodowane wirusami: Herpes simplex typu I lub typu II (opryszczka zwykła) oraz Herpes varicella-zoster (ospa wietrzna, półpasiec),
- inne zakażenia o etiologii wirusowej.

Działanie:

Lek o właściwościach immunostymulujących i przeciwwirusowych. Lek nasila chemotaksję i fagocytozę neutrofilii, monocytów i makrofagów. Lek reguluje mechanizmy cytotoksyczności limfocytów T oraz komórek NK, funkcjonowanie limfocytów supresorowych T8 oraz pomocniczych T4, a także zwiększa poziom IgG oraz powierzchniowych markerów dopełniacza. Pranobeks inozyny reguluje niedostateczne lub wadliwe mechanizmy odporności komórkowej za sprawą spowodowania odpowiedzi typu Th1, co prowadzi do dojrzewania i różnicowania limfocytów T oraz potęgowania indukowanych reakcji limfoproliferacyjnych w komórkach aktywowanych mitogenem lub antygenem. W badaniach in vivo znamienne podnosi się endogenne wytwarzanie IFN- γ , a obniża produkowanie IL-4. W badaniach in vitro potęguje produkcję cytokiny IL-1 oraz IL-2, równocześnie podnosząc ekspresję receptora IL-2.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na składniki preparatu
występujący aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi

Sposób użycia:

Doustnie. Dzieci powyżej 1 roku życia: zwyczajowa dobowo dawka zawiera 0,5 ml syropu/kg mc. w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach zażywanych w ciągu doby (mc. 10–14 kg: 3 x 2,5 ml; mc. 15–20 kg: 3 x 2,5-3,5 ml; mc. 21–30 kg: 3 x 3,5-5 ml; mc. 31–40 kg: 3 x 5-7,5 ml; mc. 41–50 kg: 3 x 7,5-9 ml). Dorośli: zwyczajowa dobowo dawka zawiera 0,5 ml/kg mc./dobę (zwykle 3 g, tj. 30 ml syropu na

dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych). Maksymalna dawka dobową wynosi 4 g.