

## Niquitin 21mg/24h 7szt



Cena: 109,54 zł

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	114 g), 21 mg/24h (0
Opakowanie	7 plast. (po 22 cm2)
Postać	plast., system transdermalny
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Nicotinum

### Opis produktu

#### Składniki

1 plaster o powierzchni 22cm<sup>2</sup> do stosowania na skórze zawiera 114mg nikotyny, dostarcza 21mg nikotyny w ciągu 24 godzin.  
Substancje pomocnicze: kopolimer etylenowinylooctanu, polietylenu tereftalen/etylenowinylooctan, wysokiej gęstości film polietylenowy, łapki kaminat poliizobutylenowy, film poliestrowy, biały atrament.

#### Działanie

Przynosi szybką ulgę w razie nagłego napadu głodu nikotynowego.

#### Dawkowanie

Plaster należy stosować raz na dobę. Jeśli w ciągu dnia wypalasz więcej niż 10 papierosów, kurację zacznij od plastra o dawce 21mg (stopień 1). Jeśli w ciągu dnia wypalasz 10 lub mniej papierosów, kurację zacznij od plastra o dawce 14mg (stopień 2).

Kuracja NiQuitin trwa 10 lub 8 tygodni w zależności od jakiego stopnia plastrów rozpocząłeś kurację:

jeśli zacząłeś z plastrami 21 mg (stopień 1) - stosuj je przez 6 tygodni. Następnie zmniejsz dawkę plastra na 14 mg (Stopień 2), które stosuj przez następne 2 tygodnie. Ostatni Stopień 3 to plastry 7 mg - stosuj je również przez 2 tygodnie.

jeżeli zacząłeś od Stopnia 2 (plastry 14mg) stosuj je przez 6 tygodni. Później przejdź do Stopnia 3 (plastry 7 mg), które będziesz używać przez następne 2 tygodnie.

#### Przeciwwskazania

U pacjentów z nadwrażliwością na miejscowo podaną nikotynę lub którykolwiek ze składników plastra, świeży zawał serca, z niestabilną dławicą sercową, dławicą Prinzmetala, ciężka arytmia, po niedawno przebyłym udarze niedokrwiennym mózgu.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.