

Niquitin 4 mg 72 szt.



Cena: 124,81 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	4 mg
Opakowanie	72 szt.
Postać	pastylki do ssania
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Nicotinum

Opis produktu

Skład

1 pastylka do ssania zawiera jako substancję czynną 4 mg nikotyny oraz substancje pomocnicze: aspartam (E 451), mannitol (E 421), alginian sodu, guma ksantanowa, wodorowęglan potasu, kopolimer poliakrylanu wapnia z glikolem diwinylowym, węglan sodu bezwodny, stearynian magnezu, aromat miętowy 57581.

Dawkowanie

Jedną pastylkę należy umieścić w jamie ustnej i od czasu do czasu przemieszczać ją z jednej strony jamy ustnej na drugą aż do całkowitego rozpuszczenia. Pastylek nie należy żuć ani połykać w całości.

W trakcie kuracji należy przestrzegać poniższego schematu dawkowania:

tydzień 1. do 6. - 1 pastylka do ssania co 1-2 godziny, co najmniej 9, a nie więcej niż 15 pastylek na dobę,
tydzień 7. do 9. - 1 pastylka do ssania co 2-4 godziny;
tydzień 10. do 12. - 1 pastylka do ssania co 4-8 godzin;
aby móc powstrzymać się od palenia przez następne 12 tygodni: stosować 1 lub dwie pastylki na dobę, tylko w przypadkach silnej ochoty zapalenia papierosa.

Wskazania

Preparat stosowany w celu łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Zaleca się jednoczesne stosowanie programu wspierającego rzucenie palenia.

Lek Niquitin, pastylki do ssania, w dawce 4 mg jest przeznaczony dla osób, które wypalają pierwszego papierosa przed upływem 30 minut po przebudzeniu.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku NiQuitin:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nikotynę lub którykolwiek ze składników leku;

jesli u pacjenta niedawno wystąpił zawał serca lub udar niedokrwieny mózgu;

jeśli u pacjenta występuje niestabilna i nasilająca się dławica piersiowa, dławica Prinzmetala, ciężkie zaburzenia rytmu serca;

jeśli pacjent jest chory na fenylketonurię;