

Nizoral krem 0,02g 30 g



Cena: 41,00 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	02 g/g, 2mg
Opakowanie	30 g
Postać	krem
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD
Rejestracja	
Substancja czynna	Ketoconazolium

Opis produktu

Skład:

Substancja czynna: ketokonazol 20mg/g. Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, alkohol stearylowy, alkohol cetylowy, monostearynian sorbitanu, polisorbata 60, mirystynian izopropylu, siarczan sodu bezwodny, polisorbata 80, woda oczyszczona.

Działanie:

Lek Nizoral 2% w formie kremu jako substancję czynną zawiera pochodną imidazolu – ketokonazol, który wykazuje działanie przeciwgrzybicze w kierunku dermatofitów z rodzajów Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum i drożdżaków z rodzajów Candida i Malassezia (Pityrosporum). Mechanizm działania kremu polega na blokowaniu biosyntezy ergosterolu, który jest składnikiem budulcowym błony komórkowej grzyba. Prowadzi to do zaburzenia przepuszczalności błony, a w konsekwencji do obumarcia dermatofitów. Produkt łagodzi świąd i ułatwia gojenie zmian skórnych. Lek działa miejscowo, nie przenika do krwi i nie daje działania ogólnego.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Nizoral krem 2% wskazany do stosowania w miejscowym leczeniu grzybicy skóry tułowia, pachwin, rąk i stóp spowodowanych przez następujące dermatofity: Trichophyton, Trichophyton floccosum, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, w leczeniu drożdżycy skóry i łupieżu pstrego (Pityriasis versicolor) oraz w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry wywołanego przez drożdżaka Pityrosporum ovale.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku oraz na pochodne imidazolu. Nie stosować w czasie ciąży i laktacji.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek krem Nizoral krem 2% może spowodować działania niepożądane takie jak podrażnienie i pieczenie skóry, rumień, reakcje nadwrażliwości.

Dawkowanie:

Krem aplikować na miejsca zmienione chorobowo oraz na obszary skóry bezpośrednio przylegające do zmian. Grzybica i drożdżycza skóry, łupież pstry: stosować raz dziennie przez 2 do 4 tygodni (grzybica kończyn); 3 do 4 tygodni (grzybica tułowia); 4 do 6 tygodni (grzybica stóp); 2 do 3 tygodni (łupież pstry i drożdżycze). Łojotokowe zapalenie skóry: stosować w zależności od stopnia nasilenia objawów, aplikować 1-2 razy dziennie przez 2 do 4 tygodni, po tym czasie stosować 1-2 razy tygodniowo w ramach tzw. leczenia podtrzymującego.