

## Nurofen 0,2g 12 tabl.powl.



Cena: 13,36 zł

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	200mg
Opakowanie	12 tabl. (blister)
Postać	tabletki powlekane
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ibuprofenum

### Opis produktu

#### Skład:

1 tabletki powlekana zawiera: substancję czynną - ibuprofen 200 mg. substancje pomocnicze: rdzeń tabletki - kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, sodu cytrynian, kwas stearynowy, krzemionka kolidalna bezwodna, otoczka cukrowa - karmeloza sodowa, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, sacharoza, tytanu dwutlenek (E 171), Macrogol 6000 tusz - Opacode S-1-8152 HV Black ( czarny tlenek żelaza (E 172), szelak, lecytyna sojowa, środek przeciwpienny DC 1510) lub czarny tusz (szelak czarny tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy).

#### Działanie:

NUROFEN ma postać tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego. W jego skład wchodzi substancja określana mianem niesteroidowego leku przeciwzapalnego, czyli ibuprofen. Wykazuje właściwości przeciwzapalne. Ponadto przynosi ulgę w przypadku dolegliwości bólowych o niewielkim i umiarkowanym nasileniu (np. ból głowy czy zęba). NUROFEN działa także przeciwgorączkowo.

#### Przeciwwskazania:

- uczulenie na substancje składowe preparatu albo na inne NLPZ
- perforacja bądź krwawienie (również występujące po przyjęciu NLPZ)
- ciężka niewydolność wątroby, nerek albo serca
- wrzody żołądka i (albo) dwunastnicy
- równoczesne stosowanie innych NLPZ, także inhibitorów COX- 2
- ostatnie trzy miesiące ciąży
- stosowanie u dzieci poniżej 12 roku życia
- skaza krwotoczna

#### Wskazania:

Lek stosować u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia w przypadku dolegliwości bólowych różnego pochodzenia, charakteryzujących się słabym albo przeciętnym nasileniem (ból stomatologiczny, np. po ekstrakcji, nerwoból, ból głowy, m.in. ból napięciowy u migrena, ból mięśni, stawów i kości, ból które towarzyszą przeziębieniu i grypie). Przyjmować również przy gorączce i

bolesnych menstruacjach.

**Dawkowanie:**

Stosować doustnie. U osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat rozpocząć od 2 tabl.. Jeżeli jest taka potrzeba, później można zastosować 1-2 tabl. co 4-6 godzin. Maksymalna dopuszczalna dawka wynosi 6 tabl./24h.