

Nurofen dla dzieci Forte truskawka 150ml



Cena: 60,59 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,04 g/ml
Opakowanie	150 ml (but.)
Postać	zawiesina doustna
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Skład:

Substancja czynna leku: ibuprofen, 40mg w każdym 1ml zawiesiny doustnej. Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharyna sodowa, polisorbit 80, bromek domifenu, malitol ciekły (E965), glicerol, guma ksantan, aromat truskawkowy (zawierający glikol propylenowy, kwas askorbowy (E300) oraz identyczne z naturalnymi substancje aromatyczne), woda oczyszczona.

Działanie:

Substancja czynna zawiesiny – ibuprofen – to wyjątkowo skuteczny i bezpieczny dla niemowląt już od 3. miesiąca życia środek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. W organizmie wpływa on na zahamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej. Nurofen Forte działa bardzo szybko, już po kwadransie od zażycia leku. Zaletą produktu jest jego skoncentrowana postać, dzięki czemu dziecko nie musi się męczyć, przyjmując dużą ilość preparatu. Dodatkowym atutem jest zachęcający truskawkowy smak.

Zastosowanie:

Nurofen Forte o smaku truskawkowym przeznaczony do objawowego, krótkotrwałego leczenia gorączki różnego pochodzenia oraz bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu. Może być stosowany również przez osoby dorosłe.

Do stosowania u dzieci od 3. miesiąca życia

Mniej płynu do połknięcia dzięki skoncentrowanej dawce

Zaczyna działać już po 15 minutach

Działa przeciwgorączkowo do 8 godzin

Informacje dodatkowe:

Preparat nadaje się do stosowania już u niemowląt od 3. miesiąca życia. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia na ibuprofen bądź podobne leki przeciwbólowe oraz w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek

składnik produktu. W przypadku stwierdzonej nietolerancji na niektóre cukry (w składzie znajduje się malitol ciekły) należy przed podaniem skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie:

Doustnie. Lek przeznaczony do stosowania doraźnego u dzieci. Dawka dobową: 20-30 mg ibuprofenu na kilogram masy ciała w dawkach podzielonych. Niemowlęta 6-12 miesiąc życia (7,7-9 kg): 1,25 ml 3-4 razy dziennie (150-200 mg/dobę). Dzieci od 1 do 3 roku życia (10-15 kg): 2,5 ml 3 razy dziennie (300 mg/dobę). Dzieci 4-6 rok życia (16-20 kg): 3,75 ml 3 razy dziennie (450 mg/dobę). Dzieci 7-9 rok życia (21-29 kg): 5 ml 3 razy dziennie (600 mg/dobę). Dzieci 10 - 12 rok życia (30-40 kg): 7,5 ml 3 razy dziennie (900 mg/dobę). Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 ml 3 razy dziennie. Preparat można również stosować (wyłącznie na zlecenie lekarza) w przebiegu odczynu poszczepiennego u niemowląt 3-6 miesiąc życia (5-7,6 kg): 1,25 ml 2 razy dziennie (drugą dawkę podać po 6 godzinach). Bez porozumienia z lekarzem nie stosować u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia (lub o masie ciała mniejszej niż 7 kg). Uwaga! Lek przeznaczony do doraźnego stosowania. Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.