

## Opokan 7,5mg 10 tabl.



Cena: 6,61 zł

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	7,5 mg
Opakowanie	10 tabl. (blist.)
Postać	tabletki
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Meloxicamum

### Opis produktu

#### Opokan skład:

Substancja czynna: meloksykam. Jedna tabletki zawiera 7,5mg meloksykamu oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, sodu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

#### Jak działa lek Opokan:

Zastosowana w produkcie leczniczym Opokan 7,5mg substancja czynna – meloksykam – wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Lek w szczególności zalecany jest przy bólach kostno-stawowych, mięśniowych (w tym: bóle łokci, kolan, kręgosłupa) odczuwanych w chorobach reumatoidalnych oraz zwyrodnieniowych stawów.

#### Zastosowanie tabletek Opokan:

Produkt leczniczy Opokan 7,5mg wskazany do krótkotrwałego leczenia zaostrzonych objawów chorób reumatoidalnych (m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa).

#### Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Możliwość zastosowania leku u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży należy skonsultować z lekarzem. Lek zawiera laktozę (43mg w jednej tabletki), dlatego osoby ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów muszą poradzić się lekarza przed przyjęciem leku.

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku oraz na kwas acetylosalicylowy. Nie stosować w przypadku, gdy wcześniej występowały napady duszności, astma, pokrzywka, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy po zastosowaniu innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby, ciężkiej niewydolności serca, czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy. Nie stosować u osób niedializowanych z ciężką niewydolnością nerek. Nie stosować w przypadku osób, u których wystąpił wylew krwi do mózgu bądź inne krwawienia (np. z przewodu pokarmowego). Nie stosować poniżej 15. roku życia. Nie stosować w trzecim trymestrze ciąży oraz w okresie laktacji.

**Działania niepożądane:**

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Zaburzenia żołądka i jelit: często – niestrawność, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia i wzdęcia, biegunka; niezbyt często – krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, zapalenie śluzówki przetyku, zapalenie śluzówki jamy ustnej; rzadko – perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie śluzówki żołądka, wrzodziejące zapalenie okrężnicy; częstość nieznana – zapalenie trzustki. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: niezbyt często – przemijające zaburzenia czynności wątroby; rzadko – zapalenie wątroby. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: często – niedokrwistość; niezbyt często – zaburzenia wskaźników morfologii krwi (leukocytopenia, trombocytopenia, agranulocytoza). Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko – reakcje nadwrażliwości. Zaburzenia psychiczne: rzadko – zmiany nastroju, koszmary senne, bezsenność. Zaburzenia układu nerwowego: często – uczucie pustki w głowie, ból głowy; niezbyt często – zawroty głowy, szumy uszne, senność; rzadko – dezorientacja. Zaburzenia oka: rzadko – zaburzenia widzenia. Zaburzenia serca: niezbyt często – kołatanie serca. Zaburzenia naczyniowe: niezbyt często – zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: rzadko – u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy (bądź inne niesteroidowe leki przeciwzapalne) notowano wystąpienie napadów astmy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: często – świąd i wysypka; niezbyt często – pokrzywka; rzadko – zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, objawy pęcherzowe (rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, obrzęk naczyńioruchowy). Zaburzenia nerek i dróg moczowych: niezbyt często – zaburzenia czynności nerek; rzadko – niewydolność nerek. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: często – obrzęki, w tym obrzęk kończyn dolnych.

**Dawkowanie tabletek Opokan 7,5mg:**

Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według zaleceń na ulotce. Stosować doustnie. Zwykle zaleca się przyjmować jedną tabletkę (7,5mg meloksykamu) na dobę. Tabletkę stosować w trakcie jedzenia, popijać płynem. W przypadku, gdy po 7 dniach stosowanie leku objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.