

Ortanol Max 0,02 x 14 kaps.



Cena: 20,59 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Dawka | 0,02 g |
| Opakowanie | 14 kapsułek |
| Postać | kapsułki dojelitowe |
| Producent | SANDOZ GMBH |
| Rejestracja | Lek OTC |
| Substancja czynna | Omeprazolom |

Opis produktu

Skład:

Każda kapsułka zawiera: omeprazol – 20mg oraz substancje pomocnicze: granulki – sacharoza, ziarenka, hypromeloza, powidon K25 sodu laurylosiarczan, magnezu tlenek ciężki, talk, kwasu metakrylowego i etyloakrylanu kopolimer 1:1, dyspersja 30%, trietylu cytrynian, magnezu stearynian. Kapsułka: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171).

Działanie:

Lek nowszej generacji wskazany w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego. Ortanol Max zawiera omeprazol. Jest to substancja czynna należąca do grupy inhibitorów pompy protonowej. Ta grupa leków powoduje zmniejszenie ilości wydzielanego w żołądku kwasu solnego. Ortanol Max to lek w postaci kapsułek dojelitowych, działających do 24 godzin.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Ortanol Max wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego. Lek może być stosowany u osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać poza zasięgiem dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed działaniem wilgoci oraz światła.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną – omeprazol, a także na podstawione benzoimidazole lub na substancje pomocnicze zawarte w leku. Nie stosować równocześnie z nelfinawirem.

Działania niepożądane:

Stosowanie leku wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych: często: bóle głowy; objawy żołądkowo-jelitowe (biegunka, ból żołądka, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem gazów); nudności, wymioty. Niezbyt często: obrzęk stóp i okolic kostek; bezsenność; zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucia, senność; zawroty głowy; zmiany w wynikach badań czynności wątroby; wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry; ogólne złe samopoczucie i brak energii. Rzadko: problemy dotyczące krwi (zmniejszenie liczby krwinek białych lub płytek krwi); reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, w tym: obrzęk warg, języka i gardła, gorączka,

świszczący oddech; małe stężenie sodu we krwi, co może spowodować osłabienie, wymioty i kurcze mięśni; uczucie pobudzenia, splątania lub depresja; zaburzenia smaku; zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie); nagła duszność (skurcz oskrzeli); suchość w jamie ustnej; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; pleśniawki (zakażenie grzybicze), które mogą pojawić się na dziąsłach; zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczką z zażółceniem skóry, ciemnym zabarwieniem moczu i uczuciem osłabienia; wypadanie włosów (łysienie), wysypka skórna w wyniku narażenia na promienie słoneczne; ból stawów lub mięśni; ciężkie zaburzenia czynności nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek); zwiększona potliwość. Bardzo rzadko: zmiany w morfologii krwi, w tym: agranulocytoza (brak białych krwinek); agresja; widzenie, odczuwanie lub słyszenie nieistniejących rzeczy (omamy); ciężkie zaburzenia czynności wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu; nagły rozwój ciężkiej wysypki lub pęcherzy na skórze albo złuszczenie skóry, objawom tym może towarzyszyć wysoka gorączka i ból stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka); osłabienie mięśni; powiększenie piersi u mężczyzn; zmniejszenie stężenia magnezu we krwi; niestrawność. Częstotliwość nieznana: mikroskopowe zapalenie jelita grubego.

Dawkowanie:

Do stosowania doustnego. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub wskazówkami zapisanymi na ulotce. Zaleca się stosować jedną kapsułkę przez 14 dni. Kapsułki należy zażywać rano – na czczo lub wraz z posiłkiem. Należy połykać w całości, popijając wodą. Przy problemach z przełykaniem, kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość bezpośrednio połknąć albo rozmieszać z wodą lub kwaśnym sokiem owocowym, zaleca się wypić od razu po sporządzeniu (maksymalnie do 30 minut od zrobienia napoju), bezpośrednio przed wypiciem należy zamieszać zawiesinę, a następnie wypić dodatkowo pół szklanki wody. Do rozpuszczania nie wolno używać wody gazowanej ani mleka. Zaleca się skonsultować z lekarzem, gdy objawy nie ustępują.