

Otrivin Allergy aerozol do nosa 15ml



Cena: 36,51 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(2, 25mg)/ml, 5mg+0
Opakowanie	15 ml (but.)
Postać	aerozol do nosa, roztw.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Dimetindenum, Phenylephrinum

Opis produktu

Składniki:

1 ml roztworu zawiera:

substancje czynne: fenylefrynę 2,5 mg; dimetyndenu maleinian 0,25 mg;

substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny, kwas cytrynowy jednowodny, sorbitol, olejek lawendowy deterpenowany, wodę oczyszczoną.

Wskazania:

Lek Otrivin Allergy (2,5 mg + 0,25 mg)/ ml aerozol do nosa stosuje się u dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych:

- w leczeniu objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego i niesezonowego
- zapalenia błony śluzowej nosa,
- wspomagająco w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok i w zapaleniu ucha środkowego,
- w pielęgnacji przed- i pooperacyjnej w chirurgii nosa.

Działanie:

Zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę.

Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę; ostatnią dawkę zaleca się przyjmować krótko przed snem.

Sposób podania:

zdejmij nasadkę ochronną, naciśnij pompkę kilka razy do zadziałania dozownika. Umieść końcówkę dozownika w otworze nosowym,

naciśnij pompkę i wyjmij ją z otworu nosowego bez zwalniania nacisku. Właściwe rozpylenie wykonywane jest w trakcie niewielkiego wdechu przez nos. Po użyciu nałóż nasadkę ochronną.

Aerozol Otrivin Allergy należy stosować wyłącznie do nosa (również w zapaleniu ucha środkowego). Lek należy stosować po dokładnym oczyszczeniu nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Leku nie należy stosować dłużej niż 7 kolejnych dni. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Przeciwwskazania:

- Uczulenie na fenylefrynę, dimetyndenu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa z powstawaniem strupów).
- Przyjmowanie obecnie inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji) lub przyjmowanie tych leków w ciągu ostatnich 14 dni.
- Jaskra z wąskim kątem przesączania.
- Wiek poniżej 6 lat.
- Ciąża i laktacja.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek Otrivin Allergy bez recepty może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.