

Oxalin Baby żel do nosa 0,25mg/g 10g(but.)



Cena: 30,07 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0, 25 mg/g
Opakowanie	10 g (but.)
Postać	żel do nosa
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu

Składniki:

1 ml roztworu lub 1 g żelu do nosa zawiera 0,25 mg lub 0,5 mg chlorowodoru oksymetazoliny.

Działanie:

Sympatykomimetyk, agonista receptora α -adrenergicznego. Zastosowany miejscowo na błonę śluzową nosa powoduje skurcz naczyń włosowatych, zmniejszając wydzielanie i obrzęk błony śluzowej. Poprawia drożność przewodów nosowych, ułatwia odpływ wydzieliny z zatok obocznych nosa. Wywiera długotrwałe działanie.

Wskazania:

Ostry nieżyt błony śluzowej nosa w przebiegu zakażenia wirusowego, zapalenia zatok lub kataru siennego i innych chorób alergicznych. Zaostrzenie przewlekłego alergicznego nieżyty nosa.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na oksymetazolinę lub inne sympatykomimetyki. Jaskra z wąskim kątem przesączenia. Nie stosować z inhibitorami MAO. Nie zaleca się stosowania dłużej niż przez 5 dni u dorosłych oraz dłużej niż 3-5 dni u dzieci. Ostrożnie stosować u pacjentów z nadciśnieniem, chorobą niedokrwinną serca, nadczynnością gruczołu tarczowego, cukrzycą, przerostem gruczołu krokowego oraz w ciąży.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż.: 2 razy dziennie po 2-3 krople roztworu lub żelu 0,05% do każdego otworu nosowego. Dzieci 2-3 r.ż.: 1 kropla roztworu 0,025% do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 5-10 h; 4-5 r.ż.: 1 kropla żelu 0,025% do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 5-10 h; 6-12 r.ż.: 1 kropla roztworu lub żelu 0,05% do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 5-10 h. Maksymalny okres stosowania u dzieci wynosi 3-5 dni.