

# Paracetamol Hasco Forte zawiesina doustna 85ml

Cena: 26,29 zł



## Opis słownikowy

|                   |   |
|-------------------|---|
| Czas dostawy      | 2-5 dni   |
| Dawka             | 0, 24 g/5ml   |
| Opakowanie        | 85 ml   |
| Postać            | zawiesina doustna   |
| Producent         | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. |
| Rejestracja       | Lek OTC   |
| Substancja czynna | Paracetamolium  |

## Opis produktu

### Składniki

Substancją czynną leku jest paracetamol. 5 ml zawiesiny zawiera 240 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, guma ksantan (E 415), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), sodu benzoian (E 211), sodu pirosiarczyn (E 223), aromat truskawkowy naturalny AR 2143 (zawiera naturalne substancje aromatyczne, w tym d-limonen oraz glikol propylenowy), woda oczyszczona.

### Działanie i właściwości

Lek Paracetamol Hasco to zawiesina doustna, której substancją czynną jest paracetamol. Produkt może być podawany do objawowego leczenia gorączki oraz bólu różnego pochodzenia. Może być stosowana w przypadku dolegliwości towarzyszących reakcji organizmu na szczepionkę.

Paracetamol Forte stosuje się u niemowląt od 0 do 3 miesiąca życia (o masie ciała do 4 kg) do leczenia objawowego gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

### Zastosowanie/wskazania

Hasco Forte to paracetamol dla dzieci, który stosuje się w przypadku gorączki i bólu różnego pochodzenia (np. po zabiegach chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów, bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu) oraz dolegliwości towarzyszących reakcji organizmu na szczepionkę (ból, gorączka, odczyn miejscowy).

### Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej, przeciętna jednorazowa dawka paracetamolu wynosi 10 mg do 15 mg na kilogram masy ciała.

W razie konieczności dawkę można powtarzać, nie częściej niż co 4-6 godzin, do 4 razy na dobę, czyli maksymalnie 60 mg/kilogram masy ciała/dobę.