


Pelafen syrop 0,02g/2,5ml 100ml



Cena: 36,96 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,02 g/2,5ml
Opakowanie	100 ml (butelka)
Postać	syrop
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Pelargonii radicis extractum siccum

Opis produktu

Skład Pelafen syrop 20mg/2,5ml:

Substancja czynna: suchy wyciąg z korzenia pelargonii (*Pelargonii radicis extractum siccum*). Każdy ml syropu zawiera 8mg suchego wyciągu (4-25:1) z *Pelargonium sidoides* DC i/lub *Pelargonium reniforme* Curt., *radix* (korzenia pelargonii); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 11% (m/m). Substancje pomocnicze: maltodekstryna, maltitol ciekły (E 965), sorbitol ciekły, niekryształujący (E 420), potasu sorbinian (E 202), kwas cytrynowy (E 330), woda oczyszczona.

Działanie Pelafen syrop 20mg/2,5ml:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z suchym wyciągiem z korzenia pelargonii. Produkt leczniczy Pelafen MED syrop 20mg/2,5ml wskazany jest do stosowania w objawowym leczeniu przeziębienia u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6. roku życia. Lek do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Pelafen syrop 20mg/2,5ml wskazany do stosowania w objawowym leczeniu przeziębienia. Lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 6. roku życia, młodzieży i dorosłych.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Należy spożyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wystąpienia duszności, gorączki, odkrztuszenia krwistej lub ropnej wydzieliny lub gdy objawy choroby nie ustąpią w ciągu tygodnia, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku objawów toksycznego działania na komórki wątroby (wymioty, brak apetytu, ból brzucha, zmęczenie, żółte zabarwienie skóry), należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem. Nie stosować z innymi produktami zawierającymi wyciąg z korzenia pelargonii. Stosowanie u dzieci: nie należy stosować poniżej 6. roku życia. Stosowanie u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią: ze względu na brak danych nie zaleca się stosować leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Stosowanie z innymi lekami: należy to skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Do tej pory nie obserwowano interakcji z innymi lekami. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: nie badano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lek zawiera maltitol – 893mg maltitolu (E 965) w dawce jednorazowej (2,5ml), osoby z nietolerancją niektórych cukrów powinny się skonsultować z lekarzem przed zastosowaniem leku. Lek

zawiera sorbitol – 625,1mg sorbitolu (E 420) w dawce jednorazowej (2,5ml), sorbitol jest źródłem fruktozy, należy się skonsultować z lekarzem przed zastosowaniem leku, jeśli została stwierdzona wcześniej nietolerancja niektórych cukrów lub dziedziczna nietolerancja fruktozy.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Działanie niepożądane:

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Bardzo rzadko: łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, utrudnione połykanie), łagodne krwawienia z dziąseł lub nosa oraz reakcje alergiczne. Częstość nieznana: przypadki hepatotoksyczności (uszkodzenia wątroby).

Dawkowanie syropu Pelafen 20mg/2,5ml:

Lek należy stosować według wskazówek lekarza lub według zaleceń na ulotce. Zalecana dawka dla młodzieży powyżej 12. roku życia, dorosłych i osób w podeszłym wieku: stosować 2,5ml syropu 3 razy na dobę. Zalecana dawka dla dzieci od 6. do 12. roku życia: stosować 2,5ml syropu 2 razy na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dobowej dawki. Nie jest zalecane stosowanie u dzieci poniżej 6. roku życia. Stosowanie u osób z niewydolnością nerek i/lub wątroby: brak danych dotyczących dawkowania. Stosować doustnie, syrop odmierzać miarką dołączoną do opakowania. Przed użyciem wstrząsnąć. Czas stosowania: należy skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy się utrzymują się lub nasilają się po 7 dniach stosowania leku.