

## Polocard 75mg 60 tabl.



Cena: 22,22 zł

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,075 g
Opakowanie	60 tabletek (6 blist. po 10 tabl.)
Postać	tabletki powlekane dojelitowe
Producent	PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH CONSUMER HEALTHCARE
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

### Opis produktu

#### Skład Polocard 0,075:

Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). Jedna tabletki zawiera 75mg kwasu acetylosalicylowego oraz składniki pomocnicze: rdzeń – skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, otoczka – hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E 124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.

#### Działanie Polocard 0,075:

Ze względu na działanie hamujące agregację płytek krwi lek wskazany jest w profilaktyce chorób układu krążenia jako środek zapobiegający tworzeniu się zakrzepów krwi. Produkt leczniczy Polocard 0,075 w jednej tabletki zawiera 75mg kwasu acetylosalicylowego. Preparat można stosować powyżej 16. roku życia.

#### Zastosowanie:

Produkt leczniczy Polocard 0,075 wskazany do stosowania w profilaktyce chorób układu krążenia, które wiążą się powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych – zawał serca, niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca, a także w profilaktyce innych chorób, w przebiegu których tworzą się zakrzepy w naczyniach. Lek odpowiedni dla dorosłych u młodzieży powyżej 18. roku życia.

#### Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Możliwość zastosowania leku u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży oraz u kobiet w okresie laktacji należy obowiązkowo omówić z lekarzem. Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Lek zawiera lak (E 124) i czerwień koszenilową – składniki te mogą powodować reakcję alergiczną.

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu leczniczego, a także na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nie stosować przy astmie oskrzelowej, przewlekłym schorzeniu układu oddechowego, gorączce siennej lub obrzęku

błony śluzowej nosa (zwiększone ryzyko wystąpienia napadu astmy, obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki). Nie stosować przy: czynnej chorobie wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, stanach zapalnych lub krwawieniu z przewodu pokarmowego, zaburzeniach krzepnięcia krwi, a także w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych (np. heparyna, pochodne kumaryny). Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności serca, nerek lub wątroby. Nie stosować u kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Nie stosować w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej oraz u dzieci poniżej 16. roku życia (zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowej – ryzyko rozwoju zespołu Rey'a). Nie stosować równocześnie z metotreksatem (dawka 15mg na tydzień lub większa).

#### **Działania niepożądane:**

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą pojawić się działania niepożądane. Są to: często – zwiększone ryzyko krwawień; wydłużenie czasu krwawienia; krwotok okołoperacyjny; krwiaki; krwawienie z nosa; krwawienia z dróg moczowo-płciowych; krwawienia dziąseł; objawy niestrawności; bóle brzucha; brak łaknienia; rzadko – trombocytopenia; wydłużenie czasu protrombinowego; krwotok, który może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i/lub niedokrwistości z niedoboru żelaza z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi – astenia, bladość, hipoperfuzja; może wystąpić niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej oraz leukopenia, agranulocytoza lub eozynopenia; krwawienie z przewodu pokarmowego; krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i/lub w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie, które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu); stany zapalne błony śluzowej żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy; przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej) i zwiększeniem stężenia bilirubiny; reakcje nadwrażliwości (m.in. odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia rytmu serca i oddychania – np. astma); po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego występowała martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek; bardzo rzadko: ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny; krwotok z przewodu pokarmowego, perforacja wrzodu żołądka, perforacja wrzodu dwunastnicy; częstość nieznana: zawroty głowy; ból głowy po długotrwałym przyjmowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek; szumy uszne (zwykle objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu; niewydolność serca; nadciśnienie tętnicze; ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym układowym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie); białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, tworzenie kamieni moczowych; ciężkie zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek po długotrwałym przyjmowaniu leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych.

#### **Dawkowanie tabletek Polocard 0,075:**

Stosować zgodnie według zaleceń lekarza lub zgodnie ze wskazówkami na ulotce. Lek przyjmować w trakcie posiłku lub po jego zakończeniu, popijać niewielką ilością wody. Zalecana dawka dobową to: 1-2 tabletki. Świeży zawał serca, podejrzenie świeżego zawału serca: początkowa dawka nasycająca to: 3-4 tabletki (225-300mg). W celu przyspieszenia wchłaniania substancji czynnej zaleca się rozgryźć tabletkę.