


# Polopiryna Gardło 24 pastylki do ssania



Cena: 42,59 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	75 mg, 8
Opakowanie	24 pastylki
Postać	pastylki twarde do ssania
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Flurbiprofenum

## Opis produktu

### Skład Polopiryna Gardło pastylki twarde o smaku pomarańczowym:

Substancja czynna: flurbiprofen (Flurbiprofenum). Jedna pastylka twarda zawiera 8,75mg flurbiprofenu oraz substancje pomocnicze: izomalt (E 953), maltitol (E 965), czerwień koszenilowa (E 124), żółcień pomarańczowa (E 110), acesulfam potasowy (E 950), makrogol 300 (E 1521), aromat pomarańczowy (limonen (50,0%-100%), dekanal (0,0%-10%) cytral, cytronelol (0,1%-1,0%)), lewomentol.

### Działanie Polopiryna Gardło pastylki twarde o smaku pomarańczowym:

Flurbiprofen jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest to substancja czynna o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym w leczeniu bólu gardła. Niesteroidowe leki przeciwzapalne wpływają na zmianę odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę. Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego Polopiryna Gardło pastylki twarde o smaku pomarańczowym są objawy stanu zapalnego gardła. Lek dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia.

### Zastosowanie:

Produkt leczniczy Polopiryna Gardło pastylki twarde o smaku pomarańczowym wskazany do krótkotrwałego stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia w łagodzeniu objawów stanu zapalnego gardła (podrażnienie, ból i obrzęk gardła i trudności w przełykaniu).

### Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku, jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał astmę lub choruje z powodu alergii; ma zapalenie migdałków (obrzęk migdałków) lub jest podejrzenie zakażenia bakteryjnego gardła (może być konieczny antybiotyk); u pacjenta występują zaburzenia sercowo-naczyniowe, zaburzenia czynności wątroby lub nerek; pacjent przebył udar; u pacjenta występowała w przeszłości choroba jelit; pacjent ma nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi); pacjent choruje na przewlekłą chorobę autoimmunologiczną (w tym toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej); pacjent jest w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); pacjentka jest w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży lub karmi piersią; u pacjenta występują bóle głowy wywołane lekami przeciwbólowymi. Nie stosować jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub kortykosteroidami. Jeśli pojawią się pierwsze objawy jakichkolwiek reakcji skórnych (wysypka, łuszczenie),

wystąpią inne objawy reakcji alergicznej, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem. Lekarzowi trzeba zgłosić wszelkie nietypowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie). Flurbiprofen może w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko ataku serca lub udaru – przy długotrwałym stosowaniu większych dawek. W trakcie leczenia należy zrezygnować ze spożywania alkoholu. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: możliwość stosowania w pierwszym i drugim trymestrze oraz w okresie karmienia piersią należy omówić z lekarzem. Stosowanie leku w trzecim trymestrze jest przeciwwskazane. Lek może zaburzać płodność u kobiet. Lek zawiera izomalt i maltitol – należy omówić z lekarzem możliwość stosowania leku, jeśli wcześniej stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna: 2,3kcal/g maltitolu i izomaltu. Lek zawiera czerwień koszenilową (E 124) i żółcień pomarańczową (E 110) – składniki te mogą wywoływać reakcje alergiczne.

#### **Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować, jeśli kiedykolwiek występowały po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych objawy: astma, niespodziewane odgłosy podczas oddychania lub trudności w oddychaniu, wydzielina z nosa, obrzęk twarzy lub wysypka skórna ze świądem (pokrzywka). Nie stosować, jeśli występuje lub występował wrzód w żołądku lub jelitach (dwa lub więcej epizodów wrzodów żołądka lub dwunastnicy). Nie stosować, jeśli wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, ciężkie zapalenie jelita grubego lub choroby krwi związane z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Nie stosować w trzecim trymestrze ciąży. Nie stosować, jeśli występuje lub występowała ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek. Nie stosować poniżej 12. roku życia.

#### **Działania niepożądane:**

Podczas stosowania mogą pojawić się działania niepożądane, jednak nie występują one u wszystkich. Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią takie objawy jak: objawy reakcji alergicznych (astma, niewyjaśniony świszczący oddech lub duszność, świąd, zapalenie błony śluzowej nosa, wysypki skórne); obrzęk twarzy, języka lub gardła powodujący trudności w oddychaniu, przyspieszone bicie serca i spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu (mogą wystąpić nawet przy pierwszym zastosowaniu leku); ciężkie reakcje skórne – łuszczenie się, powstawanie pęcherzy lub odwarstwianie skóry. Inne działania niepożądane: często – zawroty głowy, ból głowy, podrażnienie gardła, owrzodzenia jamy ustnej lub ból w jamie ustnej, ból gardła, dyskomfort lub nietypowe odczucia w jamie ustnej (uczucie ciepła, pieczenia, mrowienia, kłucia), nudności i biegunka, uczucie mrowienia i swędzenia skóry; niezbyt często – senność lub trudności w zasypianiu, zaostrzenie astmy, świszczący oddech, trudności w oddychaniu, tworzenie pęcherzy w jamie ustnej i gardle, drętwienie gardła, suchość w jamie ustnej, uczucie pieczenia w ustach, zaburzenia smaku, wzdęcia, ból brzucha, wiatry, zaparcia, niestrawność, wymioty, zmniejszenie czucia w gardle, gorączka, ból, wysypki skórne, świąd skóry; rzadko – reakcja anafilaktyczna; częstość nieznana – niedokrwistość, trombocytopenia, obrzęk, wysokie ciśnienie krwi, niewydolność serca lub atak serca, ciężkie postaci reakcji skórnych (zmiany pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella i toksyczna nekroliza naskórka), zapalenie wątroby.

#### **Dawkowanie pastylek twardych o smaku pomarańczowym Polopiryna Gardło:**

Lek przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Zalecana dawka dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia: jedna pastylka co 3-6 godzin – w razie potrzeby. Nie należy stosować więcej niż 5 pastylek na dobę. Pastylkę ssać powoli w ustach (należy ją przemieszczać w jamie ustnej), nie żuć, nie połykać w całości. Lek do krótkotrwałego stosowania. Zaleca się stosować możliwie najniższą dawkę przez najkrótszy okres potrzebny do złagodzenia objawów. Nie stosować dłużej niż 3 dni. W przypadku, gdy nie nastąpiła poprawa lub doszło do pogorszenia objawów, należy skonsultować się z lekarzem.