

# Posterisan 10 czopków



Cena: 53,40 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0, 3871 g
Opakowanie	10 czop.
Postać	czopki doodbytnicze
Producent	DR KADE PHARMAZEUT.FABRIK GMBH
Rejestracja	
Substancja czynna	Escherichia coli

## Opis produktu

### Skład:

Substancja czynna w jednym czopku: 387,1mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (zabitej 6,6mg płynnego fenolu). W skład zawiesiny wchodzi składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 660 mln bakterii Escherichia coli zabitych i konserwowanych fenolem. Pozostałe składniki to: tłuszcz stały, makrogoglycerolu hydroksystearynian.

### Działanie:

Produkt leczniczy Posterisan w postaci czopków doodbytniczych zawiera standaryzowaną zawiesinę kultury bakteryjnej Escherichia coli. Lek pobudza układ odpornościowy organizmu, a także wspiera jego naturalną reakcję obronną na zakażenia. Czopki łagodzą pieczenie i świąd odbytu. Produkt dla osób dorosłych.

### Zastosowanie:

Produkt leczniczy Posterisan czopki wskazany do stosowania w przypadku świądu, sączenia oraz pieczenia w okolicy odbytu, które spowodowane są guzkami krwawniczymi, szczelinami oraz rozpadlinami odbytu oraz wypryskiem. Produkt dla osób dorosłych.

### Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią należy skonsultować z lekarzem.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik czopków.

### Działanie niepożądane:

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Rzadko: skórne reakcje alergiczne: zaczerwienienie i świąd (ze względu na zawartość fenolu jako środka konserwującego).

### Dawkowanie czopków Posterisan:

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Zwykle zaleca się aplikować dwa razy na dobę (rano i

wieczorem). Zaleca się aplikować po wypróżnieniu, czopek należy wprowadzić głęboko do odbytnicy. Po ustąpieniu objawów zaleca się kontynuować leczenie przez kolejne dni. Produkt może być stosowany przez dłuższy czas. Zaleca się równocześnie stosować czopki i maść Posterisan.