

## Posterisan maść doodbytnicza 25g



Cena: 57,63 zł

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0,1667 g
Opakowanie	25 g
Postać	Maść doodbytnicza
Producent	DR KADE PHARMAZEUT.FABRIK GMBH
Rejestracja	
Substancja czynna	Escherichia coli

### Opis produktu

**Skład:**  
Substancja czynna w 1g maści: 166,7mg standaryzowanej zawiesziny kultury bakteryjnej Escherichia coli (zabitej 3,3mg płynnego fenolu). W skład zawiesziny wchodzi składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 330mln bakterii Escherichia coli zabitych i konserwowanych fenolem. Pozostałe składniki: lanolina, wazelina żółta.

**Działanie:**  
Produkt leczniczy w postaci maści doodbytniczej Posterisan zawiera zawiesinę kultury bakteryjnej Escherichia coli. Jest to substancja czynna, która działa stymulująco na układ odpornościowy, a tym samym na wzrost odpowiedzi immunologicznej swoistej i nieswoistej. Dodatkowo maść łagodzi pieczenie oraz świąd, działa przeciwzapalnie.

**Zastosowanie:**  
Produkt leczniczy Posterisan maść wskazany do stosowania w leczeniu świądu, sączenia oraz pieczenia w okolicy odbytu, które wywołane jest guzkami krwawniczymi, szczelinami i rozpadlinami odbytu oraz wypryskiem. Odpowiedni przy wewnętrznych i zewnętrznych żylakach odbytu w stopniu I i II.

**Informacje dodatkowe:**  
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Stosowanie maści w okresie ciąży i laktacji należy omówić z lekarzem.

**Przeciwwskazania:**  
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik maści.

**Działania niepożądane:**  
U niektórych osób podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane. Ze względu na zawartość fenolu (środek konserwujący) w przypadku nadwrażliwości może wystąpić skórna reakcja alergiczna (zaczerwienienie, świąd).

**Dawkowanie:**

Należy stosować zgodnie z zaleceniami na ulotce lub zaleceniami lekarza. Stosować dwa razy na dobę (rano i wieczorem), aplikować po wypróżnieniu. Nakładać cienką warstwę maści na skórę i błony śluzowe, które wymagają leczenia. Stosowanie preparatu w celu zapobiegania nawrotom dolegliwości może trwać przez dłuższy czas. Równocześnie z maścią zaleca się stosować czopki Posterisan.