

Proktosedon maść doodbytnicza 15g

Cena: 35,38 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(5mg+10mg+5mg+10mg)/g
Opakowanie	15 g
Postać	maść doodbyt.
Producent	POLMEX SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	cinchocaini hydrochloridum, esculinum, Hydrocortisonum, Neomycinum

Opis produktu

Skład:
1 g maści 10 mg neomycyny w postaci siarczanu, 5 mg octanu hydrokortyzonu, 5 mg chlorowodoru cynchokainy i 10 mg eskuliny.

Działanie:
Preparat do stosowania miejscowego. Neomycyna jest bakteriobójczym antybiotykiem z grupy aminoglikozydów, działającym szczególnie silnie na *Staphylococcus aureus* i pałeczki *Enterobacteriaceae* (zwłaszcza *Proteus spp.*). Hydrokortyzon - kortykosteroid o umiarkowanym działaniu. Działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwświądowo. Cynchokaina działa miejscowo znieczulająco, a eskulina - glikozyd otrzymany z kasztanowca - hamuje aktywność hialuronidazy, zmniejszając przepuszczalność naczyń krwionośnych i krwawienia.

Wskazania:
Leczenie hemoroidów, stanów zapalnych odbytu, szczeliny odbytu, świądu odbytu. Preparat może być stosowany w okresie przed- i pooperacyjnym.

Dawkowanie:
Zazwyczaj nakłada się niewielką ilość maści za pomocą dołączonego aplikatora 2 razy dziennie (rano i wieczorem) oraz po każdym wypróżnieniu.