


Reparil Gel N żel 40 g



Cena: 36,45 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(0,01g+0,05g)/g
Opakowanie	40 g
Postać	żel
Producent	MADAUS GMBH
Rejestracja	
Substancja czynna	diethylamini salicylas, Escinum

Opis produktu

Skład:

Substancjami czynnymi są: escyna (Escinum) i salicylan dietyloaminy (Diethylamini salicylas).

100 g żelu zawiera 1 g escyny i 5 g salicylanu dietyloaminy.

Substancje pomocnicze: olejek lawendowy, olejek kwiatu pomarańczy, karbomer (kwas poliakrylowy), makrogol 6 (Softigen 767), wersenian disodowy, trometamol, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Działanie:

Preparat o miejscowym działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żyłne. Zawiera mieszaninę saponin z nasion kasztanowca. Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesiek limfy, wzmacnia ukrwienie, zapobiega zastojowi krwi w żyłkach kończyn dolnych, przyspiesza wchłanianie krwinków pourazowych i chroni przed ich powstawaniem. Łagodzi bóle, usuwa obrzęki pooperacyjne.

Wskazania:

Zapobieganie i leczenie obrzęków, krwinków pourazowych, i pooperacyjnych (stłuczenia, skręcenia, ortopedia), zaburzenia krążenia żylnego w kończynach dolnych, żyłki kończyn dolnych, bóle kręgosłupa u chorych z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa (dyskopatie, bóle karku), rwa kulszowa.

Przeciwwskazania:

Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe, obszary skóry poddane napromienieniu, oraz u chorych z przewlekłymi schorzeniami nerek, I trymestr ciąży.

Działanie niepożądane:

Przejęciowe uczucie ciepła i podrażnienie.

Dawkowanie:

Zewnętrznie: cienką warstwę żelu wcierać w miejsca chore, 3-5 razy dziennie.