


Sanprobi IBS 20 kaps.



Cena: 46,17 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	20 kapsulek
Postać	Kapsułki
Producent	SANPROBI SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Składniki Sanprobi IBS:

Nośnik – skrobia ziemniaczana; L. plantarum 299v; nośnik – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

Zawartość składników w jednej kapsułce Sanprobi IBS:

Lactiplantibacillus (wcześniej Lactobacillus) plantarum 299v – 10mln. CFU (jednostek tworzących kolonię)/AFU (aktywnych jednostek fluorescencji).

Działanie Sanprobi IBS:

Probiotyk rekomendowany do stosowania u dzieci powyżej 3. roku życia oraz u osób dorosłych. Suplement diety Sanprobi IBS uzupełnia codzienną dietę w bakterie probiotyczne Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v). Bakterie te stanowią składnik mikrobioty jelitowej.

Zastosowanie Sanprobi IBS:

Suplement diety Sanprobi IBS przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety w bakterie probiotyczne Lactiplantibacillus plantarum 299v. Można stosować u dzieci powyżej 3. roku życia, dorosłych – w tym kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią, osób z zaburzeniami układu odpornościowego.

Informacje dodatkowe Sanprobi IBS:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Preparat posiada pozytywną opinię Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” nr 5/DJW/2020. Produkt bezglutenowy.

Przeciwwskazania Sanprobi IBS:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia kapsułek Sanprobi IBS:

Zalecana dzienna porcja dla dzieci od 3. do 12. roku życia: jedna kapsułka. Zalecana dzienna porcja dla młodzieży powyżej 12. roku życia i dla osób dorosłych: 1-2 kapsułki. Można stosować niezależnie od posiłku. Kapsułki popijać wodą mineralną lub wodą przegotowaną. Kapsułkę można również otworzyć i jej zawartość rozpuścić w zimnym lub letnim płynie (wodzie, mleku, herbacie) – wypić od razu po przygotowaniu. Podczas antybiotykoterapii – probiotyk stosować przez okres przyjmowania antybiotyku oraz przez 14 dni po

zakończeniu antybiotykoterapii. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.