

Saridon 10 tabl.



Cena: 20,83 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Dawka | 250mg + 150mg + 50mg |
| Opakowanie | 10 tabl. |
| Postać | tabletki |
| Producent | BAYER SP. Z O.O. |
| Rejestracja | |
| Substancja czynna | coffeinum, Paracetamolum, propyphenazolum |

Opis produktu

Skład:

1 tabletki zawiera jako substancje czynne 250mg paracetamolu, 150mg propyfenazonu, 50mg kofeiny. Substancje pomocnicze: hydroksypropylometylceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, esma-spreng, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian (substancja przeciwbrylająca), krzemu dwutlenek koloidalny.

Działanie:

Saridol to optymalna dawka dwóch substancji przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, których działanie wzmacnia kofeina. Jej korzystny wpływ wynika z faktu, że delikatnie pobudza układ nerwowy i zwęża naczynia krwionośne w mózgu. Właściwości przeciwbólowe paracetamolu polegają na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy, czyli enzymu odpowiedzialnego za syntezę mediatorów reakcji zapalnej. Zbliżony mechanizm działania wykazuje propyfenazon, dzięki czemu obniża gorączkę i przynosi ulgę w bólach wywołanych skurczami mięśni gładkich.

Zastosowanie:

Saridol polecany w celu łagodzenia bólu głowy, zęba, bólu miesiączkowego, reumatycznego oraz pooperacyjnego. Lek wskazany także wspomagająco w czasie przeziębienia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na propyfenazon, paracetamol, kofeinę, pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, aminofenazon, metamizol), fenylobutazon, kwas acetylosalicylowy, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, ostra porfiria wątrobowa. Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania mogą wystąpić: reakcje alergiczne – wysypka skórna, pokrzywka; reakcje nadwrażliwości – świąd, rumień, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, duszność, astma. W pojedynczych przypadkach: reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny (ostra, zagrażająca życiu reakcja alergiczna), małopłytkowość (zmniejszenia liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), agranulocytoza (niedobór granulocytów) i pancytopenia (niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi, tj. krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi). W przypadku pojawienia się nowych objawów niepożądanych należy skontaktować

się z lekarzem lub farmaceutą.

Informacje dodatkowe:

Nie stosować u kobiet w ciąży i podczas laktacji. Ze względu na zawartość kofeiny stosowanie w przypadku nadciśnienia, choroby wrzodowej i dusznicy bolesnej skonsultować z lekarzem.

Dawkowanie:

Przyjmować doustnie, dorośli: 1-2 tabletki do 3 razy dziennie, dzieci między 12.-16. rokiem życia: 1 tabletkę do 3 razy na dobę. Każdą tabletkę popić wodą. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki oraz nie stosować dłużej niż 7 dni.