


Sebidin Intensive 5mg+5mg 20 tabl.do ssania



Cena: 28,94 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	5mg+5mg
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki do ssania
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	benzocainum, chlorhexidini dihydrochloridum

Opis produktu

Skład Sebidin Intensive:

Substancja czynna: chlorheksydyny dichlorowodorek (Chlorhexidini dihydrochloridum) i benzokaina (Benzocainum). Jedna tabletki do ssania zawiera 5mg chlorheksydyny dichlorowodoru i 5mg benzokainy oraz substancje pomocnicze: manitol, celuloza mikrokryształiczna (PH 101), powidon K29/32, magnezu stearynian, sodu cyklamianian (E 952), sodu sacharynian (E 954), aromat mentolowy 611072E, aromat pomarańczowy 90103-71.

Działanie Sebidin Intensive:

Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego Sebidin Intensive jest ból, podrażnienie gardła oraz bezgłos, które występują przy zakażeniach jamy ustnej i gardła przebiegających bez gorączki. Lek można również przyjmować w leczeniu stanów zapalnych śluzówki jamy ustnej, gdy pojawiają się na drobne owrzodzenia śluzówki (afty). Substancjami czynnymi leku są: benzokaina i chlorheksydyny dichlorowodorek.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Sebidin Intensive wskazany do stosowania w leczeniu miejscowym objawów o natężeniu umiarkowanym w przebiegu bezgorączkowym infekcji jamy ustnej oraz gardła, którym towarzyszy ból. Lek dla młodzieży powyżej 12. roku życia i dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Lek zawiera mniej niż 1mmol sodu (23mg) w jednej tabletki do ssania, można więc uznać, że jest to produkt wolny od sodu. Produkt bez cukru.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku methemoglobinemii. Nie stosować poniżej 12. roku życia. Nie zaleca się stosować w okresie ciąży i laktacji.

Działania niepożądane Sebidin Intensive:

Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane, choć nie wystąpią one u każdego. Rzadko: podrażnienie czubka języka i

błony śluzowej jamy ustnej. Częstość nieznana: methemoglobinemia (choroba krwi związana z występowaniem nieprawidłowej hemoglobiny); reakcje alergiczne dotyczące skóry i błony śluzowej; utrata apetytu; zaburzenia smaku (rzadko trwałe); zaburzenia oddychania, przekrwienie błony śluzowej nosa, podrażnienie gardła; brązowe przebarwienie zębów, języka, nudności, niestrawność, ból brzucha, biegunka, suchość w jamie ustnej, pieczenie języka, mrowienie języka, zwiększone odkładanie się kamienia nazębnego; wysypka, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie skóry; brązowe przebarwienie wypełnień dentystycznych, protez dentystycznych i innych aparatów stosowanych w jamie ustnej.

Dawkowanie tabletek do ssania Sebidin Intensive:

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Zaleca się stosować po jednej tabletki co dwie godziny. Maksymalna dobową dawką: 8 tabletek. W przypadku, gdy po pięciu dniach leczenia objawy nie ustępują lub się pogarszają, zaleca się skonsultować z lekarzem.