

Septinum 30 tabl.do ssania



Cena: 23,66 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki do ssania
Producent	N.P.ZDROVIT SP Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Składniki:

Jedna tabletki zawiera substancje czynne: 16,5mg hialuronianu sodu i 15mg wyciągu z porostu islandzkiego (4:1) oraz pozostałe substancje: sorbitol, mannitol, guma ksantanowa, hydroksypropylometyloceluloza, poliwinylpirolidon, kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, aromat wiśniowy, guma arabska, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, sukraloza, sacharynian sodu.

Działanie:

Hialuronian sodu oraz wyciąg z porostu islandzkiego stanowią o sile wyrobu medycznego Septinum. Podczas ssania tabletki na błonie śluzowej gardła i krtani pozostaje hydrożelowy film ochronny. Przeciwdziała on niekorzystnemu działaniu czynników zewnętrznych, a także umożliwia przywrócenie naturalnej funkcji ochronnej śluzówki. Preparat nawilża i łagodzi podrażnienia. Hialuronian sodu dzięki zdolności do wiązania wody, silnie nawilża śluzówkę. Równocześnie na jej powierzchni pozostawia wilgotną warstwę. Działa on kojąco, sprzyja również regeneracji strun głosowych. Drugi składniki preparatu, czyli plecha porostu islandzkiego wykazuje właściwości osłaniające, powlekające i przeciwkaszlowe. Pomaga zredukować objawy podrażnienia gardła, a także te, które towarzyszą przeziębieniu.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Septinum przeznaczony do stosowania w łagodzeniu objawów podrażnień i suchości błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Polecany przy kaszlu i chrypcie, rekomendowany dla osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach lub osób, które pracują głosem (np. nauczyciele, lektorzy).

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować poniżej 6. roku życia.

Sposób użycia:

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek z ulotki. Dzieci powyżej 6. roku życia oraz dorośli: ssać jedną tabletkę do kilku razy dziennie. Maksymalnie stosować 6 tabletek do ssania dziennie. Tabletek nie należy połykać w całości oraz rzuć. Nie zaleca się

stosować w pozycji leżącej, aby uniknąć ryzyka udławienia lub połknięcia. W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów po 10 dniach stosowania zaleca się skontaktować z farmaceutą lub lekarzem. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.