

Sinumedin aerozol do nosa, roztwór (1,5mg+2,5mg)



Cena: 25,28 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(1, 5mg)/ml, 5mg+2
Opakowanie	15 ml
Postać	aerozol do nosa, roztw.
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	mepiraminy maleas, fenylephrini hydrochloridum

Opis produktu

Skład:

Substancje czynne: mepiraminy maleinian i fenylefryny chlorowodorek. 1ml aerozolu do nosa zawiera 1,5mg mepiraminy maleinianu i 2,5mg fenylefryny chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: glicerol, sodu chlorek, cetalkoniowy chlorek, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, polisorbata 20, wodę oczyszczoną.

Działanie:

Aerozol do nosa Sinumedin to lek zawierający aż dwie substancje czynne – mepiraminy maleinian i fenylefryny chlorowodorek. Mepiramina wykazuje działanie antyhistaminowe i przeciwalergiczne. Fenylefryna redukuje przekrwienie błon śluzowych nosa i udrażnia nos oraz ujścia zatok przynosowych. Zawarta w leku substancja pomocnicza – chlorek cetalkoniowy – ma właściwości antybakteryjne. Aerozol ułatwia oddychanie i łagodzi katar.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Sinumedin aerozol do nosa wskazany w leczeniu zapalenia zatok przynosowych, nieżyty nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa, w tym nieżyty nosa związanego z alergią.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz u dzieci poniżej 6. roku życia. Nie stosować u osób z astmą oraz wysychającym nieżytem nosa.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek Sinumedin aerozol do nosa może wywołać działania niepożądane takie jak tachykardia, kołatanie serca, arytmia; bóle i zawroty głowy, senność, uspokojenie, bezsenność, osłabienie; biegunka, nudności, zaparcia; nadciśnienie; podrażnienie i przekrwienie błon śluzowych nosa, suchość błon śluzowych.

Dawkowanie:

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek zawartych w ulotce. Podawać donosowo. Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: aplikować 2 dawki do każdego otworu nosowego co 4 do 6 godzin. Nie stosować częściej niż 5 razy na dobę. Nie stosować dłużej niż 3 dni.