

Slow-Mag 60 tabl.

Cena: 12,83 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	64 mg Mg ²⁺
Opakowanie	60 tabletek
Postać	tabletki dojelitowe
Producent	PRODUKCYJNO-HANDL.PRZED.FARMAC.CURTIS HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Magnesium

Opis produktu

Skład:

Jedna tabletkę zawiera 535mg magnezu chlorku sześciowodnego tj. 64mg jonów magnezu oraz substancje pomocnicze: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian, otoczka – Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylu etylu 1:1), dibutyli sebacynian, talk.

Działanie:

Lek jest wskazany do stosowania w objawach niedoboru magnezu, czyli przy odczuwanych bólach mięśniowych, drżeniu mięśni, tikach, bólach głowy, stanach znużenia, zaburzeniach snu, zaburzeniach rytmu serca, a także przyspieszonych zmianach miażdżycowych naczyń krwionośnych. Produkt leczniczy Slow-Mag można również stosować w trakcie przyjmowania leków o działaniu moczopędnym. Tabletki powleczone są otoczką, która nie rozpuszcza się pod wpływem działania soków żołądkowych, dlatego jej zawartość wchłaniania jest dopiero w jelicie cienkim.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Slow-Mag wskazany do stosowania w profilaktyce i leczeniu niedoborów magnezu.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. W okresie ciąży i w okresie karmienia piersią lek można stosować wyłącznie ze wskazania lekarza.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku niewydolności nerek, hipermagnezemia (podwyższonego stężenia magnezu w surowicy krwi), znacznego niedociśnienia tętniczego, zaburzeń przewodnictwa mięśnia sercowego. Nie stosować w przypadku Myasthenia gravis.

Działania niepożądane:

Podczas przyjmowania leku mogą wystąpić działania niepożądane: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym efekt przeczyszczający.

Dawkowanie:

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub zaleceniami na ulotce. Tabletek nie należy dzielić lub rozgryzać, trzeba połykać je w całości. Stosowanie profilaktyczne: zazwyczaj dwie tabletki na dobę – jedną rano i jedną wieczorem. Stosowanie w przypadku stwierdzonego niedoboru magnezu: u osób dorosłych – 6 tabletek na dobę (dwie rano i cztery tabletki wieczorem); u dzieci powyżej 6. roku życia – dawkowanie ustala lekarz.