

Starazolin Alergia krople do oczu roztwór 1 mg

Cena: 70,71 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	1 mg/ml
Opakowanie	2 but. po 5 ml
Postać	krople do oczu, roztwór
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Olopatadinum

Opis produktu

Skład Starazolin Alergia krople do oczu:

Substancja czynna: olopatadyna (Olopatadinum). Każdy ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodoru) oraz substancje pomocnicze: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, polisorbit 80, kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH), woda wysokooczyszczona.

Działanie Starazolin Alergia krople do oczu:

Krople do oczu Starazolin Alergia to produkt leczniczy dla osób dorosłych z rozpoznaniem sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Jest to lek przeciwalergiczny, jako substancję czynną zawiera olopatadynę. Lek stosuje się w leczeniu takich objawów jak zaczerwienienie, łzawienie i zaciemnienie oczu, a także obrzęk powiek i spojówek. Objawy te mogą pojawić się wskutek ekspozycji na alergeny np. sierść zwierząt, kurz domowy, pyłki roślin. Zwykle towarzyszą im również inne objawy alergiczne jak np. kichanie i wodnisty katar. Lek jest sterylnym roztworem, nie zawiera konserwantów.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Starazolin Alergia krople do oczu wskazany do stosowania w leczeniu objawów ocznych (obrzęk powiek i spojówek, zaczerwienienie, łzawienie, świąd) u osób, u których rozpoznano sezonowe alergiczne zapalenie spojówek. Do stosowania u osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów nadwrażliwości (m.in. problemów z oddychaniem, obrzęku gardła lub twarzy) należy przerwać stosowanie leku oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem. Stosowanie z innymi preparatami doocznymi: należy zachować przynajmniej 5 minut przerwy między aplikacjami kolejnych leków, przy czym leki w postaci maści należy stosować na końcu. W przypadku wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej niezbędne jest natychmiastowe leczenie doraźne. Nie należy stosować leku u dzieci oraz młodzieży poniżej 18. roku życia. Nie należy stosować leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Bezpośrednio po aplikacji nie należy prowadzić pojazdu lub obsługiwać maszyn, gdyż widzenie może być niewyraźne, należy poczekać aż widzenie się poprawi. Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Działania niepożądane:

U niektórych osób podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku wystąpienia następujących objawów należy przerwać stosowania leku i niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną: objawy reakcji nadwrażliwości m.in. problemy z oddychaniem, obrzęk gardła lub twarzy (przy wystąpieniu ciężkiej reakcji alergicznej konieczne może być natychmiastowe leczenie doraźne).

Inne działania niepożądane: często – działania dotyczące oka: ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka; objawy ogólne: bóle głowy, nieprzyjemny smak w ustach, suchość błony śluzowej nosa, zmęczenie; niezbyt często – działania dotyczące oka: zaburzenia rogówki, zapalenie powierzchni oka z uszkodzeniem jego powierzchni lub bez uszkodzenia, wydzielina z oka, nadwrażliwość na światło, niewyraźne lub ograniczone widzenie, kurcz powiek, uczucie dyskomfortu w oku, świąd oka, zaburzenia spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oku, zwiększone wytwarzanie łez, zaczerwienienie lub obrzęk powiek, nieprawidłowości w obrębie powiek, zaczerwienienie oka; objawy ogólne: zapalenie błony śluzowej nosa, zawroty głowy, nieprawidłowe lub upośledzone czucie, zapalenie skóry (kontaktowe), uczucie pieczenia skóry, suchość skóry; częstość nieznana – działania dotyczące oka: obrzęk rogówki, obrzęk oka, zapalenie spojówek, zmiana wielkości źrenicy, zaburzenia widzenia, strupki na brzegach powiek; objawy ogólne: nadwrażliwość, obrzęk twarzy, senność, duszność, zapalenie zatok, nudności, wymioty, zapalenie skóry i jej zaczerwienienie, ogólne osłabienie, złe samopoczucie.

W przypadku znacznego uszkodzenia przedniej, przezroczystej warstwy oka (rogówki) bardzo rzadko obserwowano mętne plamy na rogówce, które spowodowane zostały przez odkładanie się wapnia w trakcie leczenia.

Dawkowanie kropli do oczu Starazolin Alergia:

Lek stosować zgodnie z zaleceniami na ulotce lub według wskazań lekarza. Lek aplikować miejscowo do worka spojówkowego. Osoby, które noszą soczewki kontaktowe muszą zdjąć je przed aplikacją leku, a po jego aplikacji odczekać przynajmniej 15 minut zanim założą soczewki ponownie. Zalecana dawka dla osób dorosłych: jedna kropla do oka lub od oczu, stosować dwa razy na dobę – rano i wieczorem. Między podaniem kolejnych dawek należy zachować przynajmniej 8 godzin przerwy. Sposób użycia: przed pierwszym użyciem należy powoli ścisnąć buteleczkę aż pojawi się pierwsza kropla. Do aplikacji należy zająć najbardziej dogodną pozycję. Przed aplikacją leku należy umyć dokładnie ręce.

Głowę lekko odchylić do tyłu, powiekę delikatnie odciągnąć ku dołowi, jedną kroplę wkropić do worka spojówkowego, nie dotykając kropłomierzem oka (a także palców i innych powierzchni). Nie należy ścisnąć butelki zbyt mocno, uwolnienie kropli może potrwać kilka sekund. Po zastosowaniu buteleczkę zakręcić. Jeśli po trzech dniach stosowania leku nie nastąpi poprawa lub objawy się pogorszą, należy skontaktować się z lekarzem. Czas leczenia: do dwóch tygodni, w razie konieczności po konsultacji z lekarzem leczenie można kontynuować do czterech miesięcy. Nie należy jednak stosować leku dłużej niż 4 miesiące.