

Strepsils Intensive Direct aerosol 15ml



Cena: 37,90 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	75 mg, 8
Opakowanie	15 ml (but.)
Postać	aer.do stos.w j.ust.
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Flurbiprofenum

Opis produktu

Skład:

Substancja czynna – flurbiprofen. W jednej dawce (3 rozpylenia) znajduje się 8,75mg flurbiprofenu, co odpowiada 16,2mg/ml flurbiprofenu. Substancje pomocnicze: betadeks, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan (E218), pypylu parahydroksybenzoesan (E216), sodu wodorotlenek, aromat miętowy, aromat wiśniowy, N,2,3-trimetylo-2-izopropylbutanoamid, sacharyna sodowa, hydroksypropylbetadeks, woda oczyszczona.

Działanie:

Flurbiprofen zawarty w leku Strepsils Intensive Direct to substancja należąca do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, skutecznych w łagodzeniu stanów zapalnych i bólu gardła. Dzięki zastosowaniu formy aerozolu, lek rozpylany jest bezpośrednio w bolącym miejscu, w efekcie czego działa szybko i skutecznie.

Zastosowanie:

Aerozol Strepsils Intensive Direct polecany do krótkotrwałego stosowania w objawowym leczeniu bólu gardła.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:

Nie stosować aerozolu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Nie nadaje się do stosowania w ostatnim trymestrze ciąży. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu lub inne NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; objawów nadwrażliwości w postaci skurczów oskrzeli, kataru lub pokrzywki po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ; czynnej lub przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy. Ostrożnie stosować w przypadku astmy oskrzelowej, zaburzeń czynności wątroby, nerek lub serca, nadciśnienia, zaburzeń krzepnięcia krwi, cukrzycy.

Sposób użycia:

Przed użyciem przeczytać ulotkę informacyjną z dokładnym opisem aplikacji aerozolu. Młodzież powyżej 18. roku życia i dorośli: zaleca się stosować jedną dawkę leku – 3 rozpylenia aerozolu na tylną część gardła. Najlepiej używać co 3-6 godzin, nie przekraczając jednak 5

dawek na dobę. Nie powinno się stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.