

Tantum Verde Forte aerozol 15ml



Cena: 36,96 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	3 mg/ml
Opakowanie	15 ml
Postać	aerozol do stosowania w jamie ustnej
Producent	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

Skład

Substancją czynną jest: benzydamina (Benzydaminii hydrochloridum).

100 ml roztworu zawiera 0,3 g chlorowodorku benzydamininy.

Substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96%, olej rycynowy uwodniony, sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania miejscowego w jamie ustnej i w gardle.

Każda dawka leku dostarcza 0,17 ml roztworu.

Lek przeznaczony do krótkotrwałego stosowania.

Nie stosować dłużej niż 7 dni.

Przy pierwszym użyciu należy nacisnąć przycisk kilka razy do momentu napełnienia pompki i uzyskania właściwego rozpylenia.

Dorośli: 2-6 razy na dobę po 2-4 dawki.

Działanie

Tantum Verde Forte zawiera w swoim składzie benzydaminę, która należy do grupy leków NLPZ, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wykazuje zatem działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Dodatkowo benzydamina działa miejscowo odkażająco i znieczulająco.

Wskazania

leczenie objawowe stanów zapalnych jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapalenia krtani, leczenie objawowe zapalenia błon śluzowych, które jest efektem radioterapii, zabiegów operacyjnych laryngologicznych i

stomatologicznych, intubacji.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tantum Verde Forte:

w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

uszkodzenie skóry w wyniku nadwrażliwości na światło (odczyny fototoksyczne).

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

pieczenie lub suchość w jamie ustnej.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

skurcz krtani,

obrzęk naczynioruchowy.

Częstość nieznana:

reakcja alergiczna,

nudności, wymioty,

zawroty głowy, bóle głowy,

niedoczulica jamy ustnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Długotrwałe stosowanie może wiązać się z wystąpieniem reakcji uczuleniowej.

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne, również typu późnego.

Lek zawiera olej rycynowy uwodorniony, który może powodować reakcje skórne.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.