

Vigalex Max 4 000 I.U. 60 tabl.



Cena: 56,48 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	4 000 I.U.
Opakowanie	60 tabletek
Postać	tabletki
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Cholecalciferolum

Opis produktu

Vigalex Max 4000 - skład:

Substancja czynna: cholekalcyferol (Cholecalciferolum). Jedna tabletkę zawiera 40mg cholekalcyferolu w proszku, co odpowiada 0,1mg cholekalcyferolu (witaminy D3) oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia żelowana, kukurydziana, krospowidon (typ A), sacharoza, magnezu stearynian, sodu askorbinian, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna, all-rac-alfa-tokoferol.

Vigalex Max 4000 - działanie:

Lek przeznaczony dla osób dorosłych z otyłością (wskaźnik masy ciała – BMI >30). Produkt leczniczy Vigalex Max 4000 jest rekomendowany do stosowania w profilaktyce niedoborów witaminy D, a równocześnie schorzeń, które wynikają z tych niedoborów (np. osteomalacja, osteoporoza). Każda tabletkę zawiera 100mg cholekalcyferolu, czyli witaminy D. Witamina D to składnik niezbędny w procesie tworzenia kości.

Vigalex Max 4000 - zastosowanie:

Produkt leczniczy Vigalex Max 4000 wskazany do stosowania w profilaktyce niedoboru witaminy D oraz w profilaktyce stanów, które wynikają z niedoboru witaminy D (m.in. osteomalacja, osteoporoza). Lek przeznaczony dla osób dorosłych z otyłością (wskaźnik BMI >30).

Vigalex Max 4000 - informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Stosować pod nadzorem lekarza u osób, które już przyjmują inne preparaty z witaminą D (dodatkowe dawki witaminy D można przyjmować tylko pod nadzorem lekarza), u osób z sarkoidozą, u osób z zaburzeniami czynności nerek, u osób stosujących glikozydy nasercowe lub leki moczopędne, u osób przyjmujących witaminę D długotrwale (konieczna jest kontrola stężenia wapnia w surowicy i w moczu oraz sprawdzanie czynności nerek). Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: kobiety powinny skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia dawki. Bez konsultacji z lekarzem nie należy w tym okresie stosować dawek powyżej 2000IU na dobę. Lek zawiera sól – mniej niż 1mmol (23mg) sodu w zalecanej jednostce dawkowania, czyli preparat uznawany jest za „wolny od sodu”. Lek zawiera sacharozę, osoby ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów powinny omówić z lekarzem możliwość zastosowania leku.

Vigalex Max 4000 - przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku hiperkalcemii i/lub hiperkalciurii. Nie stosować w przypadku rzekomej niedoczynności przytarczyc. Nie stosować w przypadku kamicy nerkowej i/lub ciężkiej niewydolności nerek. Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Vigalex Max 4000 - działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane. Nie występują one u wszystkich. Częstość nieznaną: dolegliwości żołądkowo-jelitowe – zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha lub biegunka; reakcje nadwrażliwości – świąd skóry, wysypka lub pokrzywka. W przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek występuje hiperkalcemia i hiperkalciuria. W pojedynczych przypadkach opisywano zejścia śmiertelne.

Vigalex Max 4000 - dawkowanie tabletek:

Lek stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Stosować doustnie, tabletkę popić odpowiednią ilością wody. Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u osób dorosłych z otyłością: zwykle 4000IU (jedna tabletkę) na dobę (w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich). U osób z niewydolnością nerek nie stosować leku bez wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować długotrwale (dłużej niż 3 miesiące). Nie stosować w dawkach wyższych niż zalecane.