

# Voltaren Express Forte 25mg 10 kaps.

Cena: 22,67 zł



## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	25mg
Opakowanie	10 kaps.
Postać	kapsułki miękkie
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Rejestracja	
Substancja czynna	Diclofenacum

## Opis produktu

**Skład:**  
Substancja czynna – diklofenak potasowy (jedna kapsułka zawiera 25mg soli potasowej diklofenaku). Substancje pomocnicze: makrogol 600, glicerol 85%, woda oczyszczona. Skład kapsułki: żelatyna, glicerol 85%, polisorb 85/70/00 (D-sorbitol+1,4-sorbitan z mannitolem), żółcień chinolinowa 70% (E104).

**Działanie:**  
Diklofenak potasowy wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Lek Voltaren Express Forte w postaci kapsułek polecany jest do stosowania przy różnego rodzaju bólach oraz przy gorączce. Ważną cechą diklofenaku potasowego jest szybkość działania.

**Zastosowanie:**  
Produkt leczniczy Voltaren Express Forte wskazany do stosowania w bólach reumatycznych, mięśniowych, przy ostrym bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej, w bólu głowy, zębów, a także przy bolesnych miesiączkach. Można przyjmować w leczeniu objawów przeziębienia i grypy.

**Informacje dodatkowe:**  
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

**Przeciwwskazania:**  
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku występowania reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie stosować w przypadku: choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, krwawienia bądź perforacji przewodu pokarmowego, ciężkiej niewydolności nerek, wątroby lub serca, równoczesnego stosowania innych leków przeciwbólowych bądź przeciwzapalnych. Nie stosować u kobiet w ciąży, matek karmiących oraz u dzieci poniżej 14. roku życia. Nie nadaje się do stosowania u osób, u których występuje ryzyko odwodnienia.

**Działania niepożądane:**  
Podczas stosowania leku mogą pojawić się objawy niepożądane: często – ból brzucha, ból żołądka, biegunka, nudności, wzdęcia; ból

głowy, zawroty głowy; zaczerwienienie skóry. Rzadko – senność. Bardzo rzadko – zaparcia, opryszczkowe zapalenie jamy ustnej, zaburzenia smaku; mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp, drżenie; zamazane widzenie, dzwonięcie w uszach, kołatanie serca; zmiany nastroju, trudności w zasypianiu, uczucie dezorientacji.

**Dawkowanie:**

Stosować według zaleceń na ulotce bądź zgodnie z zaleceniami lekarza. Zaleca się przyjmować przez możliwie jak najkrótszy czas, w najmniejszej skutecznej dawce. Maksymalnie, bez konsultacji z lekarzem, stosować przez 5 dni w przypadku bólu lub 3 dni w przypadku gorączki. Dorośli, dzieci i młodzież powyżej 14. roku życia: dawka początkowa – 1 kapsułka przyjmowana co 4-6 godzin. Maksymalna dawka dobową – 3 kapsułki. Kapsułki przyjmować przed posiłkiem, popijając wodą.