

## Zyrtec UCB 0,01g 10 tabl.powl.



Cena: 20,02 zł

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	01 g, 10 mg
Opakowanie	10 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	VEDIM SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Cetirizinum

### Opis produktu

#### Stosowanie leku Zyrtec UCB

Długość kuracji preparatem Zyrtec UCB należy uzależnić od rodzaju oraz przebiegu objawów, a także od długości czasu ich występowania. Leczenie preparatem zawierającym cetyryzynę bez wskazania lekarskiego nie może trwać dłużej niż 10 dni. W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana należy skorzystać z pomocy lekarza, który może zdecydować o podjęciu odpowiednich środków zaradczych. Przedawkowanie leku może nasilać jego niepożądane działanie. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. Wątpliwości dotyczące przyjmowania leku Zyrtec UCB należy konsultować z lekarzem lub farmaceutą.

#### Dodatkowe zalecenia dotyczące leku Zyrtec UCB

Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji pomiędzy cetyryzyną a niewielką ilością spożywanego alkoholu. Brak jednak informacji dotyczących bezpieczeństwa pacjenta w przypadku przyjmowania większych dawek leku i alkoholu, dlatego zaleca się unikanie jednoczesnego zażywania preparatu Zyrtec UCB i spożywania alkoholu. Jeżeli pacjent planuje wykonanie testów alergicznych, powinien skonsultować z lekarzem konieczność przerwania kuracji lekiem przeciwhistaminowym.

#### Skład Zyrtec UCB:

Substancja czynna: cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletkę zawiera 10mg cetyryzyny dichlorowodoru oraz pozostałe składniki: celuloza mikrokryształiczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, Opadry Y-1-7000 (hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400).

#### Działanie Zyrtec UCB:

Cetyryzyny dichlorowodorek jest substancją czynną o działaniu przeciwalergicznym. Produkt leczniczy Zyrtec UCB w każdej tabletkę zawiera 10mg cetyryzyny dichlorowodoru. Lek ten łagodzi objawy ze strony nosa i oczu towarzyszące sezonowemu i przewlekłemu zapaleniu błony śluzowej nosa, a także łagodzi objawy pokrzywki.

#### Zastosowanie:

Produkt leczniczy Zyrtec UCB wskazany do stosowania w łagodzeniu objawów związanych z sezonowym i przewlekłym zapaleniem śluzówki nosa oraz w łagodzeniu objawów pokrzywki. Lek dla dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia.

**Informacje dodatkowe:**

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Lek zawiera laktozę, dlatego osoby ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku oraz nadwrażliwości na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Nie stosować poniżej 6. roku życia. Nie stosować u kobiet w okresie ciąży i laktacji. Nie stosować w przypadku ciężkiej choroby nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10ml/min).

**Działania niepożądane:**

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Często: senność, zawroty głowy, bóle głowy, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci), biegunka, nudności, suchość w jamie ustnej, zmęczenie. Niezbyt często: pobudzenie, parestezja (zaburzenia czucia), ból brzucha, świąd, wysypka, astenia, złe samopoczucie. Rzadko: reakcje alergiczne, czasami ciężkie (bardzo rzadko) - depresja, omamy, zachowanie agresywne, dezorientacja, bezsenność, drgawki, tachykardia, nieprawidłowa czynność wątroby, pokrzywka, obrzęk, zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: trombocytopenia, tiki, omdlenie, dyskineza, dystonia, drżenie, zaburzenia smaku, niewyraźne widzenie, zaburzenia akomodacji, rotacja gałek ocznych, obrzęk naczyńioruchowy, wysypka polekowa, zaburzenia oddawania moczu. Częstość nieznana: zwiększony apetyt, próby samobójcze, koszmary senne, utrata pamięci, zaburzenia pamięci, zawroty głowy (uczucie wirowania lub utraty równowagi), zatrzymanie moczu (niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego), świąd i/lub pokrzywka po przerwaniu stosowania leku, ból stawów, wysypka z pęcherzami zawierającymi wydzielinę ropną, zapalenie wątroby.

**Dawkowanie tabletek Zyrtec UCB:**

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według zaleceń na ulotce. Tabletki zaleca się popijać szklanką płynu, w razie konieczności tabletkę można podzielić na dwie równe części. Dorośli, młodzież powyżej 12. roku życia: zalecana dawka dobową: jedna tabletkę. Dzieci od 6. do 12. roku życia: zalecana dobową dawką po pół tabletki dwa razy na dobę. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować dłużej niż 10 dni.